レジメン名	低用量シタラビン				
対象がん種	急性骨髄性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	最小度
			再発・難治	1コースの日数	28日
				投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	46.0%	G-CSF、抗菌薬など
	血小板減少	45.0%	輸血、薬剤減量など
	貧血	25.0%	輸血、薬剤減量など
その他	嘔気	42.0%	制吐剤、補液など
	低カリウム血症	28.0%	電解質補充など
	下痢	28.0%	補液、整腸剤など

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	キロサイド	20mg/m2	皮下注			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ベネクレクスタ	備考参照	分1			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●