レジメン名	移植後weekly MTX				
対象がん種		対象患者		催吐リスク	最小度
				1コースの日数	7日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制	頻度不明	
その他	ショック、アナフィラキシー	頻度不明	
	肝障害	頻度不明	
	粘膜障害	頻度不明	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)							休薬完了
1	生理食塩液50ml メソトレキセート前フラッシュ用	20ml	点滴静注	150ml/h		●						
2	メソトレキセート点滴静注液 生理食塩液50ml	7mg/m2 30ml	点滴静注	150ml/h		●						
3	生理食塩液50ml メソトレキセート後フラッシュ用	20ml	点滴静注	150ml/h		●						
4	ロイコボリン注3mg メソトレキセート投与12時間後	7mg/m2	静注			●						
5	ロイコボリン注3mg メソトレキセート投与24時間後	7mg/m2	静注				●					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7
1	なし											