| レジメン名 | バベンチオ(アベルマブ)療法 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 皮膚がん | 対象患者 | | 催吐リスク | 最小度 |
| | | | | 1コースの日数 | 2週間 |
| | | | | 投与予定回数 | |
| 内服抗がん剤の有無 | | | | 投与回数上限 | |
| ※有の場合薬剤名 | | | | | |

| 副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など） | | | |
|---|---|---|---|
| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性 | | | |
| | | | |
| | | | |
| その他 | 重症筋無力症 | | |
| | 劇症1型糖尿病 | | |
| | 甲状腺機能障害 | | |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 1 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | アセリオ静注液 | 1000mg<br>(体重50kg未満の場合15mg/kgで再計算) | 点滴静注 | 400mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食<br>ポララミン | 50mL<br>5mg | 点滴静注 | 100mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 200mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | バベンチオ<br>生食 | 10mg/kg<br>250mL | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |