レジメン名	R-GCVP療法1コース目					
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	初発	催吐リスク	中等度	
				1コースの日数	21	
				投与予定回数	6	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	6	
※有の場合薬剤名						

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	47.5%	G-CSF、抗菌薬など
	血小板減少	31.1%	輸血、薬剤減量など
	貧血	11.4%	輸血、薬剤減量など
その他	感染症	27.9%	抗菌薬など
	発熱感	22.9%	
	心関係	16.3%	

レジメン内容（支持療法を含む）

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
																										休薬完了							
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●																				
2	オンコビン 生理食塩液	1.4mg／m2 (max 2.0mg) 50mL	点滴静注	500mL/h		●																											
3	エンドキサン 生理食塩液	750mg／m2 250mL	点滴静注	1時間		●																											
4	ゲムシタビン 生理食塩液	750mg／m2 100ml	点滴静注	200mL／h		●							●																				
5	ボララビン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/h		●																											
6	リツキシマブ 生理食塩液	375mg／m2 337.5／m2	点滴静注	備考参照		●																											
	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	プレドニン	100mg/body	分1～3 po	●	●	●	●	●																									
2	カイトリル	2mg	化学療法前	●																													
3	イブプロフェン	200mg	リツキシマブ前	●																													
4	その他予防薬等																																
5																																	