レジメン名	ビキセオス(完解導入療法)				
対象がん種	急性骨髄性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	14～35days
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	2
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	71.0%	抗菌薬
	血小板減少	29.0%	輸血など
	貧血	86.4%	輸血など
その他	発熱性好中球減少症	92.0%	抗菌薬
	出血	60.0%	輸血など
	消化管障害	86.3%	対症療法

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●		●		●									
2	ビキセオス 生理食塩液	100U/m^2 500mL	点滴静注	90分		●		●		●									
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●		●		●									

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	カイトリル	2mg	内服			●		●		●									