レジメン名	APL 地固めC4				
対象がん種	急性骨髄性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		抗菌薬、G-CSF製剤
	貧血		輸血など
	血小板減少		輸血など
その他	肝中心静脈閉塞症候群		対症療法
	Infusion reaction		

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●														●													
2	ヒドロコルチゾン ボララミン 生理食塩液	100mg 5mg 100mL	点滴静注	100mL/hr	マイロターグ投与 1時間前	●														●													
3	マイロターグ 注射用水 生理食塩液	4mg/m^2 4mL/m^2 100mL	点滴静注	2時間		●														●													
4	生理食塩液	100mL	点滴静注	50mL/hr		●														●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	アセトアミノフェン	600mg	内服			●														●													