レジメン名	フェスゴ単独（導入）				
対象がん種	乳がん	対象患者	HER2陽性乳癌術後、転移再発	催吐リスク	最小度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
			切除不能進行・再発	投与予定回数	1回(備考欄参照)
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	備考欄参照
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他	頭痛	1%以上	鎮痛薬
	悪心、下痢、嘔吐	1%以上	整腸剤、制吐薬等
	呼吸困難	1%以上	呼吸器内科相談、減量中止を検討

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	フェスゴIN	15ml （ベルツズマブ1200mg トラスツズマブ600mg）	皮下注	8分		•																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									