レジメン名		•	イミフィン	ッジ	
対象がん種	肝臓がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	最小度
		1		1コースの日数	4週毎
		1		投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし	1		投与回数上限	なし
※右の場合薬剤タ		7			

	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他	間質性肺炎	0.8%	Grade1になるまで中止
	甲状腺機能低下	4.9%	Grade1になるまで中止
	甲状腺機能亢進	4.0%	症状が安定するまで中止

## レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	3	3	4	5 6	6	7 8	3	9 1	11	12	13	3 14	1 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
_	1 生食	50ml	点滴静注	15分		•																									$\Box$		
4	4 イミフィンジ 生食	1500mg 100ml	点滴静注	1時間		•																											
- (	5 生食	50ml	点滴静注	30分		•																									$\Box$		

内服抗がん剤・支持療法薬																														
Rp 薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 なし																														