レジメン名	オラパリブ＋ベバシズマブBS				
対象がん種	卵巣がん	対象患者	難治	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	ベバシズマブ21回orPD
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	オラパリブ2年orPD
※有の場合薬剤名	リムパーザ				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少	16.3%	G3休薬、G4中止
	貧血	40.9%	G3休薬、G4中止
その他	悪心	53.3%	G3休薬
	疲労	52.9%	
	高血圧	45.8%	G3休薬、G4中止

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				
2	ベバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	30min		●																				
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	リムパーザ	300mg/回	1日2回			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●