

レジメン名	GEM+S-1				
対象がん種	胆道がん	対象患者		催吐リスク	軽度
	膵がん			1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名	TS-1				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容(支持療法を含む)

				day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																				休薬完了
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h		●						●													
2	生食 パロノセトロン デキサート	100 ml 0.75mg 6.6 mg	点滴静注	200 ml/h		●						●													
3	生食 ゲムシタビン	100 ml 1000 mg/m ²	点滴静注	200 ml/h		●						●													
4	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h		●						●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	S-1	40～60 mg/回	1日2回			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●							