レジメン名	nab-PTX				
対象がん種	肺がん	対象患者	再発	催吐リスク	軽度
			切除不能進行・再発	1コースの日数	21日
				投与予定回数	規定なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	規定なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	80.8%	G-CSF
	貧血	97.6%	輸血
	血小板減少	23.7%	
その他	発熱性好中球減少	2.0%	抗菌薬投与
	末梢神経障害	55.5%	適正使用ガイドに準ずる
	肺障害	9.4%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	200ml/hr		●							●							●						
2	生食 デキサート	50ml 6.6mg	点滴静注	100ml/hr		●							●							●						
3	アブラキサン点滴静注用 生食	100mg/m2 20mL／m2	点滴静注	30分		●							●							●						
4	生食	50ml	点滴静注	200ml/hr		●							●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									