レジメン名	低用量MTX + VBL				
対象がん種	デスモイド型線維腫症	対象患者	再発・難治	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	7日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球現症	62.0%	G1になるまで休薬
	貧血	47.0%	G1になるまで休薬
その他	肝機能障害	76.0%	G1になるまで休薬
	嘔気・嘔吐	28.0%	G3では休薬

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)							休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	200mL/hr		●						
2	生理食塩水 エクザール	50ml 6mg/m2	点滴静注	200mL/hr		●						
3	生理食塩水 メトトレキサート	50ml 30mg/m2	点滴静注	200mL/hr		●						
4	生理食塩水	50ml	点滴静注	200mL/hr		●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7
1	なし											