レジメン名	PLD-C+ベバシズマブ				
対象がん種	卵巣がん	対象患者	再発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	16回
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	12.0%	減量・延期
	発熱性好中球減少	1.0%	GCSF・抗生剤投与・減量
その他	高血圧	28.0%	降圧薬
	心不全	1.0%	中止
	血栓症	2.0%	抗凝固薬

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●														●												
2	生食 デキサート	100ml 4.95mg	点滴静注	100ml/h		●																										
3	5%ブドウ糖 ドキシル	250ml 30mg/m2	点滴静注	200ml/h		●																										
4	5%ブドウ糖 カルボプラチン	250ml AUC:5	点滴静注	60分		●																										
5	生食	50ml	点滴静注	200ml/h		●																										
6	生食 ベバシズマブ	100ml 10mg/kg	点滴静注	初回90分、2回目60分、3回目以降30分		●														●												
7	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●														●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロン	2mg	内服			●																										
2	イメンド	125mg	内服			●																										
3	イメンド	80mg	内服				●	●																								