レジメン名	レミトロ				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	8サイクル
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制	63.2%	定期的な採血検査
その他	毛細血管漏出症候群	13.5%	本剤投与前後に生理食塩水等の輸液
	infusion reaction	51.4%	抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛剤、副腎皮質ホルモン剤の前投与
	肝機能障害	89.2%	定期的な採血検査
	視力障碍・色覚異常	23.1%	投与開始前、開始後の定期的な眼科診察で対応

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	250ml	点滴静注	250ml/h		●	●	●	●	●																
2	デキサート ポララミン 生食	6.6mg 5mg 50ml	点滴静注	100ml/h		●	●	●	●	●																
3	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●	●	●	●	●																
4	レミトロ 注射用水 生食	9μg/kg 0.06ml/kg 50ml	点滴静注	50ml/h		●	●	●	●	●																
5	生食	250ml	点滴静注	250ml/h		●	●	●	●	●																

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カロナール	600mg	ポララミン投与時に内服			●	●	●	●	●																
2	カイトリル	2mg	ポララミン投与時に内服			●																				