

| レジメン名 | | リンパ球除去療法(CY+Flu, B-ALL) | | | |
|-----------|--------|-------------------------|--|---------|-----|
| 対象がん種 | 悪性リンパ腫 | 対象患者 | | 催吐リスク | 中等度 |
| | | | | 1コースの日数 | 6 |
| 内服抗がん剤の有無 | | | | 投与予定回数 | |
| ※有の場合薬剤名 | | | | 投与回数上限 | |

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) | | |
|------------------------|-------|--------------|
| 項目 | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性 | | |
| | | |
| その他 | | |
| | | |

レジメン内容(支持療法を含む)

| | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--------------|-------------------------------|------|----------|-----------|---|---|---|---|------|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | 休薬完了 |
| 1 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/hr | | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | エンドキサン 生食 | 500mg/m ² 250mL | 点滴静注 | 125mL/hr | | ● | ● | | | |
| 3 | フルダラ 生食 | 30mg/m ² 100mL | 点滴静注 | 200mL/hr | | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/hr | | ● | ● | ● | ● | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-------|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイトリル | | | | ● | ● | | | | |