レジメン名	オプジーボ＋FP療法(Nivo4週毎)				
対象がん種	食道がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	未定
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	無
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	21.0%	減量・中止・延期
	血小板減少	11.6%	減量・中止・延期
	白血球数減少	13.9%	減量・中止・延期
その他	腎毒性	23.9%	減量・中止・延期
	胃腸毒性	20.6%	減量・中止・延期
	皮膚毒性	17.4%	減量・中止・延期

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	200ml/hr	主管A	●																											
2	生食	100 ml	点滴静注	200ml/hr	側A-1	●																											
4	オプジーボ 生食	480 mg 100 ml	点滴静注	1時間	側A-1	●																											
5	生食	100 ml	点滴静注	30分間	側A-1	●																											
6	デキサート プロイメンド 生食	9.9mg 150mg 100mL	点滴静注	30分間	側A-1	●																											
7	デキサート 生食	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分間	側A-1		●	●	●	●																							
8	パロノセトロン 生食	0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分間	側A−1	●																											
9	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	100ml/hr	主管A	●																											
10	硫酸Mg補正液 生食	20 mL 100mL	点滴静注	30分間	側A-1	●																											
11	シスプラチン 生食	80 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	2時間	側A-1	●																											
12	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	800 mg/㎡ 500 mL	持続静注	24時間	側A-1	●	●	●	●	●																							
13	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	100ml/hr	主管A	●																											
14	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	100ml/hr	主管A	●																											
15	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	100ml/hr	主管A	●																											
16	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	100ml/hr	主管A	●																											
17	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	80ml/hr	主管A		●	●	●	●																							
18	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	80ml/hr	主管A		●	●	●	●																							
19	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	80ml/hr	主管A		●	●	●	●																							
20	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	80ml/hr	主管A		●	●	●	●																							

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																