レジメン名	NEL療法				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者		催吐リスク	最小度
	悪性リンパ腫			1コースの日数	21日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	神経系障害	頻度不明	
	骨髄抑制	頻度不明	
		0.0%	
その他		0.0%	
		0.0%	
		0.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液50ml アラノンジー前フラッシュ用	20ml	点滴静注			●	●	●	●	●																
2	アラノンジー静注用250mg 50ml 前後で生食フラッシュ メイン止め、フィルター可	650mg/m2	点滴静注	1時間		●	●	●	●	●																
3	生理食塩液50ml アラノンジー後フラッシュ用	20ml	点滴静注			●	●	●	●	●																

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																										