レジメン名	JPLSG-ALL-B19 維持療法				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	
				1コースの日数	56
				投与予定回数	4～6
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	6
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												
1	メソトレキセート キロサイド 水溶性プレドニゾロン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8mL	髄注	髄注		●																											

					day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	メソトレキセート キロサイド 水溶性プレドニゾロン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8mL	髄注	髄注																													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	メソトレキセート	20mg/m^2	分1			●							●							●							●						
2	ロイケリン	50mg/m^2	分1、就寝前			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	メソトレキセート	20mg/m^2	分1			●							●							●							●						
2	ロイケリン	50mg/m^2	分1、就寝前			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●