

レジメン名	AML-20 強化療法-1(共通),3(IR,HR) HCM				
対象がん種	急性骨髄性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	5
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	
				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	-	
	-	
	-	
その他	-	
	-	
	-	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6
1	生食50mL (プロイメンド用)	20mL	点滴静注				●					休薬完了
2	プロイメンド 生食	3mg/kg(max150mg) 100mL (0.6-1.5mg/mLになるよ うに調整)	点滴静注	1時間			●					
3	ブレドニン 生食	60mg/m <sup>2</sup> (max60mg) 50mL	点滴静注	30分			●	●	●	●	●	
4	グラニセトロン 生食	0.04mg/kg 3mL	静注				●	●	●	●	●	
5	生食50ml (シタラビン用)	20mL	点滴静注				●	●	●	●	●	
6	シタラビン 生食	2g/m <sup>2</sup> 250ml	点滴静注	3時間	10時		●	●	●	●	●	
7	生食50ml (シタラビン用)	20mL	点滴静注				●	●	●	●	●	
8	生食50ml (ノバントロン用)	20ml	点滴静注				●	●	●			
9	ノバントロン 生食	5mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	1時間			●	●	●			
10	生食50ml (ノバントロン用)	20mL	点滴静注				●	●	●			
11	ブレドニン 生食	60mg/m <sup>2</sup> (max60mg) 50mL	点滴静注	30分			●	●	●	●	●	
12	グラニセトロン 生食	0.04mg/kg 3mL	静注				●	●	●	●	●	
13	生食50mL (シタラビン用)	20ml	点滴静注				●	●	●	●	●	
14	シタラビン 生食	2g/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	3時間	22時		●	●	●	●	●	
15	生食50ml (シタラビン用)	20mL	点滴静注				●	●	●	●	●	
16	メントレキセート キロサイド ヒドロコルチゾン 注射用水	12mg 30mg 25mg 4.8mL	髄注				●					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6
1	フルメトロン点眼		1日3回点眼		●	●	●	●	●	●