

レジメン名	Mosun-Pola 1サイクル目				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21 days
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名	なし			投与予定回数	
				投与回数上限	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	24.4% G-CSF、抗菌薬など
	貧血	14.1% 輸血など
	血小板減少	8.9% 輸血など
その他	サイトカイン放出症候群	25.9% トシリズムブ、ステロイドなど
	ICANS	4.0% ステロイドなど

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分		●							●								●						休薬完了
2	デキサメサゾン 生理食塩液	19.8mg 50mL	点滴静注	30分	ポライビー1時間前	●																					
3	ボラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	30分	ポライビー30分前	●																					
2	デキサメサゾン 生理食塩液	19.8mg 50mL	点滴静注	30分	ルンスミオ1時間前								●								●						
3	ボラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	30分	ルンスミオ30分前								●								●						
4	ポライビー点滴静注 注射用水 生理食塩液	1.8mg/kg 0.09mL/kg 100mL(体重40kg未満は 50mL)	点滴静注	90分		●																					
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	90分	経過観察用	●																					
6	ルンスミオ皮下注	5mg	皮下注		30秒かけて	●																					
7	ルンスミオ皮下注	45mg	皮下注		30秒かけて								●								●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	アセトアミノフェン	600-900mg	内服	ポライビー1時間前	●																					
1	アセトアミノフェン	600-900mg	内服	ルンスミオ1時間前								●								●						