

レジメン名	エリブリン単独療法				
対象がん種	骨軟部腫瘍	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	白血球減少	23.0%	
	好中球減少	52.0%	
	貧血	19.0%	
その他	末梢神経障害	35.0%	
	脱毛	45.0%	
	疲労	54.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h			●							●													休薬完了
2	デキササート 生食	6.6mg 50ml	点滴静注	100ml/h			●							●													
3	ハラヴェン 生食	1.4mg/m <sup>2</sup> 50ml	点滴静注	500ml/h			●							●													
4	生食	50ml	点滴静注	100ml/h			●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																									

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

生食	50ml
----	------

100 ml/h

②  
点滴静注

デキササート	6.6mg
生食	50ml

100 ml/h

③  
点滴静注

ハラヴェン	1.4mg/m <sup>2</sup>
生食	50ml

500 ml/h

④  
点滴静注

生食	50ml
----	------

100 ml/h

炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不