

レジメン名		ALL-B19再寛解導入療法(IIA) IR, HR群 CNS2,3			
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	
				1コースの日数	35
内服抗がん剤の有無	あり			投与予定回数	1
※有の場合薬剤名	デカドロン			投与回数上限	1

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		
その他		

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h										●							●														
2	オンコピン 生理食塩液	1.5mg/m2 (max 2.0mg) 50mL	点滴静注	500mL/h										●							●														
3	ドキシソルビン 生理食塩液	30mg/m2 100mL	点滴静注	1時間										●							●														
4	ロイターゼ 5%ブドウ糖液	10000U/m2 * 200ml	点滴静注	1時間										●		●					●		●												
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h										●							●														
6	メソレキセート キロサイド ブレドニン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8ml	随注				●																●												

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)	day	29	30	31	32	33	34	35
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h			●						
2	オンコピン 生理食塩液	1.5mg/m2 (max 2.0mg) 50mL	点滴静注	500mL/h			●						
3	ドキシソルビン 生理食塩液	30mg/m2 100mL	点滴静注	1時間			●						
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h			●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	デカドロン	10 mg/m2 *	分1 po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2	デカドロン	5 mg/m2	分1 po																																
3	デカドロン	2.5 mg/m2	分1 po																																
4	デカドロン	1.25 mg/m2	分1 po																																
5	カイトリル	2mg	化学療法前内服									●														●									

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	29	30	31	32	33	34	35
1	デカドロン	10 mg/m2 *	分1 po								
2	デカドロン	5 mg/m2	分1 po								
3	デカドロン	2.5 mg/m2	分1 po								
4	デカドロン	1.25 mg/m2	分1 po		●	●					
5	カイトリル	2mg	化学療法前内服		●						