レジメン名	ADR（3日間）				
対象がん種	骨軟部腫瘍	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	500mg/㎡まで
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他	心筋傷害、心不全	不明	投与中止
	間質性肺炎	不明	投与中止

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	ヘパリンNaロック用	1筒	点滴静注			●																				
2	生食	50ml	点滴静注	200ml/h			●																			
3	生食 デキサート プロイメンド	100ml 4.95mg 150mg	点滴静注	100ml/h	9:15～9:45		●																			
4	生食	50ml	点滴静注	100ml/h			●																			
5	フィジオ140	500ml	点滴静注	71ml/h	10:00～17:00		●	●	●																	
6	生食 ドキソルビシン	500ml 30mg/㎡	点滴静注	24時間	10:15～翌10;15		●	●	●																	
7	ソルデム3A	500ml	点滴静注	71ml/h	17:00～24:00		●																			
8	ソルデム3A	500ml	点滴静注	56ml/h				●	●	●																
9	生食 デキサート	100ml 9.9mg	点滴静注	100ml/h	9:00～10:00			●	●																	
10	フィジオ140	500ml	点滴静注	71ml/h	17:00～24:00			●	●																	
11	生食	100ml	点滴静注	50ml/h	9:00～11:00					●																
12	生食	50ml	点滴静注	200ml/h						●																
13	ヘパリンNaロック用	1筒	点滴静注							●																

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カイトリル	2mg	投与前内服				●	●	●																	