

病院フォーミュラリー

Clostridioides difficile 感染症（CDI）治療（成人）

可能なかぎり現行（発症時）の抗菌薬投与終了を検討する

発症既往・難治の評価

初発例

メトロニダゾール
（フラジール内服錠250mg）

1回 500mg 1日3回 10日間経口投与

メトロニダゾールに対するアレルギーや副作用等によりメトロニダゾールが使用できない場合：

バンコマイシン
（塩酸バンコマイシン散0.5g）

1回 125mg 1日4回 10日間経口投与

CDI発症後8週間以内の再発

バンコマイシン
（塩酸バンコマイシン散0.5g）

1回 125mg 1日4回 10日間経口投与

難治例

フィダキソマイシン
（ダフクリア錠200mg）

1回200 mg 1日2回10日間経口投与

ICD許可薬のため使用前にICDに電話が必要

【院内】

■内服ができない場合、メトロニダゾール点滴静注（アネメトロ）を選択する

■難治例とは

1. CDI に対する初回治療以降、2 回以上の再発例
2. バンコマイシン内服治療にもかかわらず、治療終了時までの下痢の改善を認めない例、もしくはショック、腸閉塞、巨大結腸症、腸穿孔を認め、CDI が原因と考えられる例

【参考】

商品名	一般名	先発/後発	剤形	総薬剤費（※）
フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	先発	錠剤	¥2,172
塩酸バンコマイシン散0.5g	バンコマイシン	先発	散剤	¥8,743
ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン	先発	錠剤	¥80,256
アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール	先発	注射	¥33,930

※成人において治療1クールにかかる薬剤費の目安

参考文献

- ・ *Clostridioides difficile* 感染症診療ガイドライン2022
- ・ J Infect Chemother.2018 ; 57(11): 907-914.
- ・ J Infect Chemother.2022; 28(11):1536-1545.
- ・ 各薬剤の添付文書、インタビューフォーム

2025年4月更新Ver.2

作成：感染制御室、薬剤部医薬品情報管理室

本フロー問い合わせ先：感染制御室専従薬剤師