レジメン名	強化療法BLIN 2サイクル目（45kg以上/CNS1,CNS2）				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者		催吐リスク	
				1コースの日数	42日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	サイトカイン放出	46.2%	添付文書に準じる
	発熱	46.2%	
	血小板減少	34.6%	添付文書に準じる
その他		0.0%	
		0.0%	
		0.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day −1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デキサート注射液 10mg/m2 生理食塩液50ml 開始6時間前までに	10mg/m2 50ml	点滴静注	100ml/h			●																											
2	デキサート注射液5mg/m2 生理食塩液50ml 開始30分前までに	5mg/m2 50ml	点滴静注	100ml/h			●																											
3	ビーリンサイト点滴静注用 35μg ミズ（注射用水） 生理食塩液 ビーリンサイト1Aを注射用水3mlで溶解、そのうち2.6mlを使用 フィルター通して ＊残量あっても24時間で翌日分に交換	28μg 2.6ml 270ml	点滴静注	10ml/h			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	グラニセトロン静注液1mg/1mL 生理食塩液20ml 髄注前	0.04mg/kg 4ml	静注			●																												
5	メソトレキセート5mg キロサイド注40mg2mL プレドニン10mg ミズ（注射用水）20mL 髄注【3歳以上】	12mg 30mg 10mg 5.8ml	髄注			●																												

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)	day 29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1																			休薬完了

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day −1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1																																	

Rp	薬剤名	投与量	用法		day 29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1																		