レジメン名	フェスゴ+DOC2回目以降				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	軽度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
			切除不能進行・再発	投与予定回数	1回
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	52.8%	
	発熱性好中球減少	13.8%	
その他	下痢	66.8%	
	悪心	42.3%	
	Infusion reaction	頻度不明	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●																			
2	フェスゴMA	10ml （ベルツズマブ600mg トラスツズマブ600mg）	皮下注	5分			●																			
3	ボララミン デキサート 生理食塩液	5 mg 6.6 mg 50 ml	点滴静注	200 ml/h			●																			
4	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m^2 250 ml	点滴静注	1時間			●																			
5	生理食塩液	50 ml		100 ml/h			●																			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン錠	8 ㎎/日	1日2回			●●		●●	●●																	