

採用薬品一覧

2026/04/07 現在

処方箋に表示される薬剤名	一般名	採用区分
[覚]エフピーOD錠2.5mg	塩酸セレギリン	院外採用
【般】アシクロビル軟膏5% 5g/本(参考:ゾビラックス軟膏)	アシクロビル	院外採用
【般】アシクロビル顆粒400mg/g(参考:ゾビラックス)	アシクロビル	院外採用
【般】アジスロマイシン錠250mg(参考:ジスロマック)	アジスロマイシン水和物	院外採用
【般】アジルサルタン錠20mg (参考:アジルバ)	アジルサルタン	院外採用
【般】アジルサルタン錠40mg (参考:アジルバ)	アジルサルタン	院外採用
【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠 (参考:パファリンA81)	アスピリン81mg・ダイアルミネート	院外採用
【般】アズレン点眼液0.02%5mL(参考:AZ点眼)	アズレン	院外採用
【般】アセトアミノフェン錠300mg(参考:加ナール)	アセトアミノフェン	院外採用
【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg (参考:アゼラチン)	塩酸アゼラスチン	院外採用
【般】アゼルニジピン錠16mg(参考:カルロック)	アゼルニジピン	院外採用
【般】アゾセミド錠60mg(参考:ダイアト)	アゾセミド	院外採用
【般】アテノロール錠25mg(参考:テノミン)	アテノロール	院外採用
【般】アテノロール錠50mg(参考:テノミン)	アテノロール	院外採用
【般】アトモキセチンカプセル10mg(参考:ストラテラ)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
【般】アトモキセチンカプセル25mg(参考:ストラテラ)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
【般】アトモキセチンカプセル40mg(参考:ストラテラ)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
【般】アトモキセチンカプセル5mg(参考:ストラテラ)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
【般】アトルバスタチン錠10mg(参考:リトル)	アトルバスタチンカルシウム	院外採用
【般】アトルバスタチン錠5mg(参考:リトル)	アトルバスタチンカルシウム	院外採用
【般】アナストロゾール錠1mg(参考:アミメックス)	アナストロゾール	院外採用
【般】アムロジピン2.5・アトルバスタチン10錠(参考:カデュエット4番)	アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg	院外採用
【般】アムロジピン5・アトルバスタチン10配合錠(参考:カデュエット4番)	アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg	院外採用
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg(参考:アムロジン)	アムロジピンベシル	院外採用
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg(参考:リスミック)	アメジニウムメチル硫酸塩	院外採用
【般】アリピプラゾール経口液0.1% 1mL/包(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	院外採用
【般】アリピプラゾール経口液0.1% 3mL/包(参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	院外採用
【般】アリピプラゾール錠12mg (参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	院外採用
【般】アリピプラゾール錠1mg (参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	院外採用
【般】アリピプラゾール錠3mg (参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	院外採用
【般】アリピプラゾール錠6mg (参考:エビリファイ)	アリピプラゾール	院外採用
【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg(参考:アルファロール)	アルファカルシドール	院外採用
【般】アルファカルシドールカプセル1μg(参考:アルファロール)	アルファカルシドール	院外採用
【般】アルファカルシドール錠0.5μg(参考:ワンアルファ)	アルファカルシドール	院外採用
【般】アレンドロン酸錠35mg(参考:フォスマック/ボナロ)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外採用
【般】アロプリノール錠100mg(参考:ザイロリック)	アロプリノール	院外採用
【般】アンブロキシール塩酸塩徐放錠45mg(参考:ムコソルバソル)	アンブロキシール塩酸塩	院外採用
【般】イマチニブ錠100mg (参考:グリベック)	イマチニブメシル酸塩	院外採用
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg(参考:カトス)	イミダフェナシン	院外採用
【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg (参考:イミダプリル)	イミダプリル	院外採用
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg (参考:イミダプリル)	イミダプリル	院外採用
【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠(参考:アイクスHD)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	院外採用
【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠(参考:アイクスLD)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	院外採用
【般】イルベサルタン錠100mg(参考:アバプロ)	イルベサルタン	院外採用
【般】イルベサルタン錠50mg(参考:アバプロ)	イルベサルタン	院外採用
【般】エシタロプラム錠10mg (参考:レクサプロ)	エシタロプラムシュウ酸塩	院外採用
【般】エスゾピクロン錠1mg(参考:ルネスタ)	エスゾピクロン	院外採用

【般】 エスタゾラム錠2mg(参考:エロジン)	エスタゾラム	院外採用
【般】 エゼチミブ・アトルvastatin10mg錠(参考:アゼットLD)	エゼチミブ・アトルvastatinカルシウム水和物	院外採用
【般】 エゼチミブ・アトルvastatin20mg錠(参考:アゼットHD)	エゼチミブ・アトルvastatinカルシウム水和物	院外採用
【般】 エゼチミブ・ロスバスタチン5mg配合錠(参考:ロスゼット)	エゼチミブ・ロスバスタチンカル	院外採用
【般】 エゼチミブ錠10mg(参考:ゼチア)	エゼチミブ	院外採用
【般】 エソメプラゾールカプセル10mg(参考:ネシウム)	エソメプラゾール	院外採用
【般】 エソメプラゾールカプセル20mg(参考:ネシウム)	エソメプラゾール	院外採用
【般】 エチゾラム錠1mg(参考:デパス)	エチゾラム	院外採用
【般】 エバスチン口腔内崩壊錠10mg(参考:エバステル)	エバスチン	院外採用
【般】 エバスチン口腔内崩壊錠5mg(参考:エバステル)	エバスチン	院外採用
【般】 エバルレスタット錠50mg(参考:ネダック)	エバルレスタット	院外採用
【般】 エピナスチン塩酸塩錠20mg(参考:アレジオン)	塩酸エピナスチン	院外採用
【般】 エピナスチン点眼液0.05% 5mL(参考:アレジオン)	エピナスチン	院外採用
【般】 エプレレノン錠25mg(参考:セララ)	エプレレノン	院外採用
【般】 エプレレノン錠50mg(参考:セララ)	エプレレノン	院外採用
【般】 エペリゾン塩酸塩錠50mg(参考:ミオナル)	エペリゾン塩酸塩	院外採用
【般】 エルデカルシトールカプセル0.75μg(参考:エドイール)	エルデカルシトール	院外採用
【般】 エレトリプタン錠20mg(参考:レルパックス)	エレトリプタン臭化水素酸塩	院外採用
【般】 エンタカポン錠100mg(参考:ユムタ)	エンタカポン	院外採用
【般】 エンテカビル錠0.5mg(参考:パファルード)	エンテカビル水和物	院外採用
【般】 オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g(参考:トリカ)	オメガ-3脂肪酸エチルカプセル	院外採用
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ジブレキサ)	オランザピン	院外採用
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠5mg(参考:ジブレキサ)	オランザピン	院外採用
【般】 オランザピン細粒10mg/g(参考:ジブレキサ)	オランザピン	院外採用
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg(参考:オルメック)	オルメサルタン メドキシミル	院外採用
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg(参考:オルメック)	オルメサルタン メドキシミル	院外採用
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg(参考:オルメック)	オルメサルタン メドキシミル	院外採用
【般】 オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:アレロック)	オロパタジン塩酸塩	院外採用
【般】 オロパタジン塩酸塩顆粒5mg/g(参考:アレロック)	オロパタジン	院外採用
【般】 オロパタジン点眼液0.1% 5mL(参考:パタノール)	オロパタジン塩酸塩	院外採用
【般】 カペシタピン錠300mg(参考:セロタ)	カペシタピン	院外採用
【般】 カモスタットメシル酸塩錠100mg(参考:フォパソ)	カモスタットメシル酸塩	院外採用
【般】 カリジノゲナーゼ錠25単位(参考:カルナクリン)	カリジノゲナーゼ	院外採用
【般】 カリジノゲナーゼ錠50単位(参考:カルナクリン)	カリジノゲナーゼ	院外採用
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg(参考:アドナ)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院外採用
【般】 カルベジロール錠10mg(参考:アチスト)	カルベジロール	院外採用
【般】 カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠(参考:エシアHD)	カンデサルタン・アムロジピン配合剤	院外採用
【般】 カンデサルタン8・ヒドロロキサジド配合錠(参考:エカードHD)	カンデサルタン・ヒドロロキサジド配合剤	院外採用
【般】 カンデサルタン錠2mg(参考:プロブレ)	カンデサルタン シレキセチル	院外採用
【般】 カンデサルタン錠4mg(参考:プロブレ)	カンデサルタン シレキセチル	院外採用
【般】 カンデサルタン錠8mg(参考:プロブレ)	カンデサルタン シレキセチル	院外採用
【般】 クエチアピン細粒50%(参考:セロケル)	クエチアピルフマル酸塩	院外採用
【般】 クエチアピン錠100mg(参考:セロケル)	クエチアピルフマル酸塩	院外採用
【般】 クエチアピン錠12.5mg(参考:セロケル)	クエチアピルフマル酸塩	院外採用
【般】 クエチアピン錠200mg(参考:セロケル)	クエチアピルフマル酸	院外採用
【般】 クエチアピン錠25mg(参考:セロケル)	クエチアピルフマル酸塩	院外採用
【般】 グラニセトロン経口ゼリー2mg(参考:カイトリル)	グラニセトロン塩酸塩	院外採用
【般】 クラリスロマイシン錠50mg(参考:ケリス)	クラリスロマイシン	院外採用
【般】 グリクラジド錠40mg(参考:グリミクロ)	グリクラジド	院外採用
【般】 グリメピリド錠0.5mg(参考:アマリール)	グリメピリド	院外採用
【般】 グリメピリド錠3mg(参考:アマリール)	グリメピリド	院外採用
【般】 クロトリマゾールクリーム1% 10g(参考:エンバシド)	クロトリマゾール	院外採用

【般】 クロトリマゾール錠100mg(参考:エンペシド)	クロトリマゾール	院外採用
【般】 クロピドグレル錠25mg(参考:プレックス)	クロピドグレル硫酸塩	院外採用
【般】 クロピドグレル錠75mg(参考:プレックス)	クロピドグレル硫酸塩	院外採用
【般】 クロピドグレル外用液0.05% 5g/本(参考:デルベート)	プロピオン酸クロベタゾール	院外採用
【般】 クロピドグレル外用液0.05% 10g/本(参考:デルベート)	プロピオン酸クロベタゾール	院外採用
【般】 クロピドグレル軟膏0.05% 5g/本(参考:デルベート軟膏)	クロベタゾールプロピオン酸エステル	院外採用
【般】 ケトプロフェン 20mg(温感)7枚/袋(参考:モリス)	ケトプロフェン	院外採用
【般】 ケトプロフェン 20mg(非温感)7枚/袋(参考:モリス)	ケトプロフェン	院外採用
【般】 ケトプロフェン 40mg(温感)7枚/袋(参考:モリス)	ケトプロフェン	院外採用
【般】 ケトプロフェン 40mg(非温感)7枚/袋(参考:モリス)	ケトプロフェン	院外採用
【般】 ケトプロフェン 120mg(非温感)7枚/袋(参考:モリス)	ケトプロフェン	院外採用
【般】 ゲフィチニブ錠250mg(参考:レルサ)	ゲフィチニブ	院外採用
【般】 ギャルトプロフェン錠 80 mg (参考:ソレトン)	ギャルトプロフェン	院外採用
【般】 サルボグレラート塩酸塩錠100mg(参考:アプラーグ)	サルボグレラート塩酸塩	院外採用
【般】 ジアゼパム錠2mg(参考:セルソ/ホリソ)	ジアゼパム	院外採用
【般】 ジアゼパム錠5mg(参考:セルソ/ホリソ)	ジアゼパム	院外採用
【般】 ジエノゲスト錠0.5mg(参考:ディナゲスト)	ジエノゲスト	院外採用
【般】 ジエノゲスト錠1mg(参考:ディナゲスト)	ジエノゲスト	院外採用
【般】 シクロスポリンカプセル10mg(参考:ネオス)	シクロスポリン	院外採用
【般】 シクロスポリンカプセル25mg(参考:ネオス)	シクロスポリン	院外採用
【般】 ジクロフェナクNaゲル1% 25g(参考:ボルタ)	ジクロフェナクナトリウム	院外採用
【般】 ジクロフェナクNa錠25mg(参考:ボルタ)	ジクロフェナクナトリウム	院外採用
【般】 ジピリダモール錠25mg(参考:ペルソ)	ジピリダモール	院外採用
【般】 ジフルコロン・リドカイン配合坐剤(参考:ネオス)	ジフルコロン吉草酸エステル・リドカイン	院外採用
【般】 ジメチコン錠 40 mg (参考:ガスコ)	ジメチコン	院外採用
【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg(参考:プレタール)	シロスタゾール	院外採用
【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg(参考:プレタール)	シロスタゾール	院外採用
【般】 シロドシン口腔内崩壊錠4mg(参考:エリー)	シロドシン	院外採用
【般】 シンバスタチン錠5mg(参考:リボバ)	シンバスタチン	院外採用
【般】 スピロラクトン錠25mg(参考:アルダクト)	スピロラクトン	院外採用
【般】 スマトリブタン錠50mg(参考:イミラン)	コハク酸スマトリブタン	院外採用
【般】 スルピリド錠50 mg (参考:ドグマチール)	スルピリド	院外採用
【般】 セチリジン塩酸塩錠10mg (参考:ゼリック)	塩酸セチリジン	院外採用
【般】 セルトリン口腔内崩壊錠25mg(参考:ゼイロ)	セルトラリン塩酸塩	院外採用
【般】 セレコキシブ錠100mg(参考:セルコックス)	セレコキシブ	院外採用
【般】 センノシド錠12mg(参考:プレノ)	センノシド	院外採用
【般】 ソタロール錠40 mg (参考:ソタール)	ソタロール塩酸塩	院外採用
【般】 ゴピクロン錠 7.5 mg (参考:アピ)	ゴピクロン	院外採用
【般】 ソリフェナシク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ペシ)	コハク酸ソリフェナシン	院外採用
【般】 ソリフェナシク酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:ペシ)	コハク酸ソリフェナシン	院外採用
【般】 ゴルピデム酒石酸塩錠5mg(参考:マイリー)	ゴルピデム酒石酸塩	院外採用
【般】 ゴルミトリブタン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:ゾーミック RM)	ゴルミトリブタン	院外採用
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg(参考:ハルナル)	タムスロシン	院外採用
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg(参考:ハルナル)	タムスロシン	院外採用
【般】 タルチレリン錠5mg(参考:セルジ)	タルチレリン水和物	院外採用
【般】 チキジウム臭化物カプセル10mg (参考:チキ)	チキジウム臭化物	院外採用
【般】 チザニジン錠1mg(参考:チザ)	チザニジン塩酸塩	院外採用
【般】 テオフィリンシロップ用20% 200mg/g	テオフィリン	院外採用
【般】 テキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg(参考:メジ)	テキストロメトルファン臭化水素	院外採用
【般】 テモゾロミドカプセル100mg(参考:テモ)	テモゾロミド	院外採用
【般】 テモゾロミドカプセル20mg(参考:テモ)	テモゾロミド	院外採用
【般】 デュロキセチンカプセル20mg(参考:サイン)	デュロキセチン塩酸塩	院外採用

【般】テルピナフィン錠125mg(参考:テピール)	テルピナフィン塩酸塩	院外採用
【般】テルミサルタン40・ヒドクロロチアジド配合錠(参考:ミコンビAP)	テルミサルタン、ヒドクロロチアジド配合錠	院外採用
【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠(参考:ミカムAP)	テルミサルタン40mg・アムロジピン5mg	院外採用
【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠(参考:ミカムBP)	テルミサルタン80mg・アムロジピン5mg	院外採用
【般】テルミサルタン錠20mg(参考:ミカルイ)	テルミサルタン	院外採用
【般】テルミサルタン錠40mg(参考:ミカルイ)	テルミサルタン	院外採用
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg(参考:カテリン)	ドキサゾシンメシル酸塩	院外採用
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg(参考:カテリン)	ドキサゾシン	院外採用
【般】トコフェロールニコチン酸エステル錠100mg(参考:トコフェールN)	トコフェロールニコチン酸エステル	院外採用
【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg(参考:トコフェール)	トコフェロール酢酸エステル	院外採用
【般】ドネベジル口腔内崩壊錠10mg(参考:アセプトD)	ドネベジル	院外採用
【般】ドネベジル口腔内崩壊錠3mg(参考:アセプトD)	ドネベジル	院外採用
【般】ドネベジル口腔内崩壊錠5mg(参考:アセプトD)	ドネベジル	院外採用
【般】トラセミド錠4mg(参考:ルパック)	トラセミド	院外採用
【般】トラネキサム酸カプセル250mg(参考:トランサミン)	トラネキサム酸	院外採用
【般】トラネキサム酸錠250mg(参考:トランサミン)	トラネキサム酸	院外採用
【般】トラネキサム酸錠500mg(参考:トランサミン)	トラネキサム酸	院外採用
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠(参考:トラマセット)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	院外採用
【般】トラマドール口腔内崩壊錠25mg(参考:トラマール)	トラマドール塩酸塩	院外採用
【般】トリアゾラム錠0.125mg(参考:ルシオン)	トリアゾラム	院外採用
【般】トリアゾラム錠0.25mg(参考:ルシオン)	トリアゾラム	院外採用
【般】トリクロルメチアジド錠1mg(参考:フルイトラン)	トリクロルメチアジド	院外採用
【般】トリクロルメチアジド錠2mg(参考:フルイトラン)	トリクロルメチアジド	院外採用
【般】ドンペリドンシロップ用10mg/g(参考:ドネペリドンシロップ)	ドンペリドン	院外採用
【般】ドンペリドン錠10mg(参考:ドネペリン)	ドンペリドン	院外採用
【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g(参考:アキアム)	ナジフロキサシン	院外採用
【般】ナジフロキサシン外用液1% 20mL(参考:アキアム)	ナジフロキサシン	院外採用
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg(参考:ナフト)	ナフトピジル	院外採用
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg(参考:ナフト)	ナフトピジル	院外採用
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg(参考:ナフト)	ナフトピジル	院外採用
【般】ナラトリプタン錠2.5mg(参考:アマジ)	ナラトリプタン塩酸塩	院外採用
【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg(参考:レミッチ)	ナルフラフィン塩酸塩	院外採用
【般】ニザチジン錠150mg(参考:アシノン)	ニザチジン	院外採用
【般】ニルバジピン錠4mg(参考:ニバジール)	ニルバジピン	院外採用
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02錠(参考:ルナールULD)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	院外採用
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035錠(参考:ルナールLD)	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	院外採用
【般】バゼドキシフェン錠20mg(参考:ビビアント)	バゼドキシフェン酢酸塩	院外採用
【般】バラシクロビル錠500mg(参考:バルトレックス)	バラシクロビル塩酸塩	院外採用
【般】バルサルタン・アムロジピン配合OD錠(参考:エックスフォーゼOD)	バルサルタン・アムロジピンメシル酸塩	院外採用
【般】バルサルタン・ヒドクロロチアジド12.5配合錠(参考:コティEX)	バルサルタン、ヒドクロロチアジド配合錠	院外採用
【般】バルサルタン錠40mg(参考:テイオハン)	バルサルタン	院外採用
【般】バルサルタン錠80mg(参考:テイオハン)	バルサルタン	院外採用
【般】ハロペリドール錠0.75mg(参考:セネス)	ハロペリドール	院外採用
【般】ハロペリドール錠1.5mg(参考:セネス)	ハロペリドール	院外採用
【般】ハロペリドール錠1mg(参考:セネス)	ハロペリドール	院外採用
【般】ハロペリドール錠3mg(参考:セネス)	ハロペリドール	院外採用
【般】バンテチン散20%(参考:バンテチン)	バンテチン	院外採用
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL(参考:ヒアレイン)	ヒアルロン酸ナトリウム	院外採用
【般】ピオグリタゾン錠15mg(参考:アクトス)	ピオグリタゾン塩酸塩	院外採用
【般】ピオグリタゾン錠30mg(参考:アクトス)	ピオグリタゾン	院外採用
【般】ピカルタミド口腔内崩壊錠80mg(参考:カテックス)	ピカルタミド	院外採用
【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10mL(参考:ピコソパロン)	ピコスルファートナトリウム	院外採用

【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg(参考:メイテート)	ビソプロロールフマル酸塩	院外採用
【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg(参考:メイテート)	ビソプロロールフマル酸塩	院外採用
【般】 ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg(参考:リハロ)	ピタバスタチンカルシウム	院外採用
【般】 ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg(参考:リハロ)	ピタバスタチンカルシウム	院外採用
【般】 ピタバスタチンCa錠1mg(参考:リハロ)	ピタバスタチンカルシウム	院外採用
【般】 ビペリデン塩酸塩錠1mg(参考:アキネトン)	ビペリデン塩酸塩	院外採用
【般】 ビルシカイニド塩酸塩錠7.5mg(参考:サリズム)	ビルシカイニド塩酸塩	院外採用
【般】 ビルシカイニド塩酸塩錠15mg(参考:サリズム)	ビルシカイニド塩酸塩	院外採用
【般】 ビルダグリプチン・メチルミン250mg配合錠(参考:イクメットLD)	ビルダグリプチン・メチルミン250mg	院外採用
【般】 ビルダグリプチン・メチルミン500mg配合錠(参考:イクメットHD)	ビルダグリプチン・メチルミン500mg	院外採用
【般】 ビルダグリプチン錠50mg(参考:イクア)	ビルダグリプチン	院外採用
【般】 ファモチジン散10%(参考:カクタ散)	ファモチジン	院外採用
【般】 フェキソフェナジン・ブソイドエドリン配合錠(参考:デイルグ)	フェキソフェナジン・ブソイドエドリン	院外採用
【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg(参考:アレグ)	フェキソフェナジン塩酸塩	院外採用
【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg(参考:アレグ)	フェキソフェナジン塩酸塩	院外採用
【般】 フェノフィブラート錠53.3mg(参考:ヒデイル)	フェノフィブラート	院外採用
【般】 フェノフィブラート錠80mg(参考:ヒデイル)	フェノフィブラート	院外採用
【般】 フェブキソスタット錠10mg(参考:フェブリク)	フェブキソスタット	院外採用
【般】 フェブキソスタット錠20mg(参考:フェブリク)	フェブキソスタット	院外採用
【般】 フェブキソスタット錠40mg(参考:フェブリク)	フェブキソスタット	院外採用
【般】 プセレリン酢酸塩点鼻液0.15%(参考:スプレキア)	プセレリン	院外採用
【般】 プラバスタチンNa錠10mg(参考:ハロチン)	プラバスタチンナトリウム	院外採用
【般】 プランルカストカプセル112.5mg(参考:オノン)	プランルカスト水和物	院外採用
【般】 プランルカストシロップ用100mg/g(参考:オノドライシロップ)	プランルカスト水和物	院外採用
【般】 プリモニジン点眼液0.1% 5mL(参考:アイワゴン)	プリモニジン	院外採用
【般】 プリンゾラム点眼液1% 5mL(参考:エイグプト)	プリンゾラム	院外採用
【般】 フルスルチアミン錠25mg(参考:アリナミンF)	フルスルチアミン	院外採用
【般】 フルチカゾン点鼻液27.5ug56噴霧(参考:アラミスト)	フルチカゾンフランカルボン酸エ	院外採用
【般】 フルニトラゼパム錠1mg(参考:サレール)	フルニトラゼパム	院外採用
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg(参考:デプロメル)	フルボキサミンマレイン酸塩	院外採用
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg(参考:デプロメル)	フルボキサミンマレイン酸塩	院外採用
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠25mg(参考:リカ)	プレガバリン	院外採用
【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠75mg(参考:リカ)	プレガバリン	院外採用
【般】 フロセミド錠10mg(参考:ラシックス)	フロセミド	院外採用
【般】 フロセミド錠20mg(参考:ラシックス)	フロセミド	院外採用
【般】 フロセミド錠40mg(参考:ラシックス)	フロセミド	院外採用
【般】 プロナンセリン錠4mg(参考:ロセ)	プロナンセリン	院外採用
【般】 プロパフェノン塩酸塩錠150mg(参考:プロノン)	プロパフェノン塩酸塩	院外採用
【般】 プロピペリン塩酸塩錠10mg(参考:プロップフォー)	プロピペリン塩酸塩	院外採用
【般】 ベニジピン塩酸塩錠4mg(参考:コニール)	ベニジピン塩酸塩	院外採用
【般】 ベプリジル塩酸塩錠100mg(参考:ベプリコール)	ベプリジル塩酸塩水和物	院外採用
【般】 ベプリジル塩酸塩錠50mg(参考:ベプリコール)	ベプリジル塩酸塩水和物	院外採用
【般】 ベポタスチンベシル酸塩錠10mg(参考:リカ)	ベポタスチンベシル酸塩	院外採用
【般】 ベポタスチンベシル酸塩錠10mg(参考:リカ)	ベポタスチンベシル酸塩	院外採用
【般】 ベラパミル塩酸塩錠40mg(参考:ワラ)	ベラパミル塩酸塩	院外採用
【般】 ペリンドプリルエルブミン錠2mg(参考:コパシ)	ペリンドプリルエルブミン	院外採用
【般】 ペリンドプリルエルブミン錠4mg(参考:コパシ)	ペリンドプリルエルブミン	院外採用
【般】 ペロスピロン塩酸塩錠4mg(参考:ルーラン)	ペロスピロン塩酸塩水和物	院外採用
【般】 ベンズプロマロン錠25mg(参考:リノム)	ベンズプロマロン	院外採用
【般】 ベンズプロマロン錠50mg(参考:リノム)	ベンズプロマロン	院外採用
【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg(参考:ベイス)	ボグリボース	院外採用
【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg(参考:ベイス)	ボグリボース	院外採用

【般】ポビドンヨードゲル10% 90g(参考:イジソゲル)	ポビドンヨード	院外採用
【般】ポリコナゾール錠200mg(参考:ブイェント)	ポリコナゾール	院外採用
【般】マニジピン塩酸塩錠10mg(参考:カスロト)	塩酸マニジピン	院外採用
【般】マブロピロリン塩酸塩錠25mg(参考:ルジオミール)	塩酸マブプロチリン	院外採用
【般】ミグリトール錠50mg(参考:セイブル)	ミグリトール	院外採用
【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg(参考:メリジン)	ミドドリン塩酸塩	院外採用
【般】ミノドロン酸錠50mg(参考:リカルボン)	ミノドロン酸	院外採用
【般】ミルタザピン錠15mg(参考:リフレックス)	ミルタザピン	院外採用
【般】メチルジゴキシン錠0.1mg(参考:メニベット)	メチルジゴキシン	院外採用
【般】メトクロプラミド錠5mg(参考:メリンパラン)	メトクロプラミド	院外採用
【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エ	メドロキシプロゲステロン酢酸エ	院外採用
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg(参考:メマリ)	メマンチン塩酸塩	院外採用
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg(参考:メマリ)	メマンチン塩酸塩	院外採用
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg(参考:メマリ)	メマンチン塩酸塩	院外採用
【般】モキシフロキサシン塩酸塩	モキシフロキサシン塩酸塩	院外採用
【般】モサプリドケン酸塩散1%(参考:カスチン)	モサプリドケン酸塩水和物	院外採用
【般】モメタゾン点鼻液50μg112噴霧用(参考:メネックス)	モメタゾンフランカルボン酸エス	院外採用
【般】モンテルカストナトリウム錠5mg(参考:キプレス/シグレア)	モンテルカストナトリウム	院外採用
【般】モンテルカストナトリウム錠10mg(参考:シグレア/キプレス)	モンテルカストナトリウム	院外採用
【般】モンテルカストナトリウム細粒4mg(参考:シグレア/キプレス)	モンテルカストナトリウム	院外採用
【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL(参考:キタタン)	ラタノプロスト	院外採用
【般】ラベプラゾールNa錠10mg(参考:パリエット)	ラベプラゾールナトリウム	院外採用
【般】ラベプラゾールNa錠20mg(参考:パリエット)	ラベプラゾールナトリウム	院外採用
【般】ラメルテオン錠8mg(参考:ロレム)	ラメルテオン	院外採用
【般】ラモトリギン錠100mg(参考:ラモトリギン)	ラモトリギン	院外採用
【般】ラモトリギン錠25mg(参考:ラモトリギン)	ラモトリギン	院外採用
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg(参考:エピスタ)	塩酸ラロキシフェン	院外採用
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg(参考:タブロン)	ランソプラゾール	院外採用
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg(参考:タブロン)	ランソプラゾール	院外採用
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg(参考:マカルト)	リザトリプタン安息香酸塩	院外採用
【般】リスベリドン経口液0.1%(参考:リスバダール)	リスベリドン	院外採用
【般】リスベリドン口腔内崩壊錠2mg(参考:リスバダール)	リスベリドン	院外採用
【般】リスベリドン細粒10mg/g(参考:リスバダール)	リスベリドン	院外採用
【般】リセドロン酸Na錠17.5mg(参考:アクトレル/ベネット)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外採用
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg(参考:アクトレル/ベネット)	リセドロン酸ナトリウム	院外採用
【般】リセドロン酸Na錠75mg(参考:アクトレル/ベネット)	リセドロン酸ナトリウム	院外採用
【般】リルゾール錠50mg(参考:リルテック)	リルゾール	院外採用
【般】ルリコナゾールクリーム1% 10g/本(参考:ルリコン)	ルリコナゾール	院外採用
【般】ルリコナゾール軟膏1% 10g/個(参考:ルリコン)	ルリコナゾール	院外採用
【般】レトロゾール錠2.5mg(参考:フェマラ)	レトロゾール	院外採用
【般】レバグリニド錠0.5mg(参考:シュアボスト)	レバグリニド	院外採用
【般】レバミピド顆粒20%(100mg/包)(参考:ムコスタ)	レバミピド	院外採用
【般】レベチラセタム錠500mg(参考:イケブ)	レベチラセタム	院外採用
【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%(参考:レボセチリジンDS)	レボセチリジン塩酸塩	院外採用
【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg(参考:サイヤル)	レボセチリジン塩酸塩	院外採用
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠(参考:メネット)	レボドパ・カルビドパ水和物	院外採用
【般】レボフロキサシン錠250mg(参考:クレビット)	レボフロキサシン水和物	院外採用
【般】レボフロキサシン錠500mg(参考:クレビット)	レボフロキサシン	院外採用
【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL(参考:クレビット)	レボフロキサシン水和物	院外採用
【般】ロキシシロマイシン錠150mg(参考:リッド)	ロキシシロマイシン	院外採用
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg(参考:ロキソ)	ロキソプロフェンナトリウム	院外採用
【般】ロカルタ100・ヒドロコルチゾン配合錠(参考:プレミントHD)	ロカルタカラム, ヒドコルチゾン配合剤	院外採用

【般】ロサルタン50・ヒドクロロチアジド 配合錠(参考:プレニントLD)	ロサルタンカリウム, ヒドクロロチアジド 配合剤	院外採用
【般】ロサルタンK錠100mg(参考:ニューロタン)	ロサルタンカリウム	院外採用
【般】ロサルタンK錠25mg(参考:ニューロタン)	ロサルタンカリウム	院外採用
【般】ロサルタンK錠50mg(参考:ニューロタン)	ロサルタンカリウム	院外採用
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg(参考:クレストール)	ロスバスタチンカルシウム	院外採用
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg(参考:クレストール)	ロスバスタチンカルシウム	院外採用
【般】ロピニロール徐放錠2mg(参考:レキップ)	ロピニロール塩酸塩	院外採用
【般】ロピニロール徐放錠8mg(参考:レキップ)	ロピニロール塩酸塩	院外採用
【般】ロペラミド塩酸塩がセル1mg(参考:ロペミン)	塩酸ロペラミド	院外採用
【般】塩化カリウム徐放錠600mg(参考:スロケー)	塩化カリウム	院外採用
【般】酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム	院外採用
【般】酸化マグネシウム錠500mg	酸化マグネシウム	院外採用
【般】小児用アンプロキシール塩酸塩シロップ 0.3%(参考:ムコソルバン)	アンプロキシール塩酸塩	院外採用
【般】酢酸亜鉛錠 2.5mg (参考:ヘルジン)	酢酸亜鉛水和物	院外採用
【般】水酸化Al <sup>3+</sup> ・水酸化Mg配合シロップ 用(参考:マロックス)	水酸化アルミニウムゲル,水酸化マグネシウム	院外採用
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg(参考:ホスレナル)	炭酸ランタン水和物	院外採用
5-FU軟膏5%協和5g	フルオロウラシル	院外採用
Dソルビトール液7.5%	D-ソルビトール	院内院外採用
L-アスパラギン酸Ca錠 200mg「ト-7」(アスパラCA後発)	L-アスパラギン酸カルシウム	院内院外採用
MSコンチン錠 10mg	硫酸モルヒネ	院内院外採用
MS温シップ40g×5枚/包	リチル酸メシル, dl-カンフル, トリカリンキス	院内院外採用
PL配合顆粒	サリチルアミド, アセトアミノフ	院内院外採用
PPSB-HT500単位「タタ」(溶解液付)	乾燥人血液凝固第IX因子複合体	院内院外採用
S・M配合散 1.3g/包	タジスターゼ,メチル酸アルミン酸Mg,炭酸	院内院外採用
SPトローチ0.25mg「明治」	塩化デカリニウム	院内院外採用
アーチスト錠 1.25mg	カルベジロール	院外採用
アーチスト錠 2.5mg	カルベジロール	院外採用
アーテン散 10mg/g	塩酸トリヘキシフェニジル	院外採用
アーテン錠 2mg	塩酸トリヘキシフェニジル	院外採用
アーリーダ錠 60mg	アバルタミド	院外採用
アイセントレス錠 400mg	ラルテグラビルカリウム	院内院外採用
アイトロール錠 20mg	一硝酸イソソルビド	院内院外採用
アイビーディカプセル 100mg	トシル酸スプラタスト	院外採用
アイベータ配合点眼液 5mL/本	グリメジニ酒石酸塩・フェロ-ルマレイン酸塩	院外採用
アイモビーグ皮下注70mgペン	エレヌマブ (遺伝子組換え)	院内院外採用
アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/本	グリメジニ酒石酸塩・グリゾラミド	院外採用
アキネトン細粒1% (10mg/g)	塩酸ピペリデン	院外採用
アクテムラ皮下注162mgオ-トインジェクター	トシリズマブ	院内院外採用
アクトシン軟膏3% 30g	ブクラデシンナトリウム	院内院外採用
アコニンサン錠	加工ブシ末	院内院外採用
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	院外採用
アサコール錠 400mg	メサラジン	院外採用
アザルフィジンEN錠 500mg	サラゾスルファピリジン	院内院外採用
アシクロビル錠200mg「サイ」(ゾビラックス後発)	アシクロビル	院内院外採用
アシクロビル顆粒400mg/g「ト-7」(ゾビラックス顆粒後発)	アシクロビル	院内院外採用
アジスロマイシン錠250mg「サイ」(ジスロマック後発)	アジスロマイシン	院内院外採用
アシノン錠 7.5mg	ニザチジン	院外採用
アジョビ皮下注225mgオ-トインジェクター	フレマネズマブ (遺伝子組換え)	院内院外採用
アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」(アジール後発)	アジルサルタン	院内院外採用
アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	院外採用
アスコルビン酸原末	アスコルビン酸	院外採用
アスタットクリーム 1% 10g	ラノコナゾール	院外採用

アスタット外用液1%10mL	ラノコナゾール	院外採用
アスタット軟膏1%10g	ラノコナゾール	院外採用
アストミン錠10mg	リン酸ジメモルファン	院外採用
アズノールST錠口腔用5mg	アズレン	院内院外採用
アズノール軟膏0.033%20g/本	ジメチルイソプロピルアズレン	院内院外採用
アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム	院内院外採用
アスピリン	アスピリン	院内院外採用
アスペノンカプセル20mg	塩酸アプリンジン	院内院外採用
アスベリンシロップ5mg/mL	ヒベンズ酸チペピジン	院外採用
アスベリン散100mg/g	ヒベンズ酸チペピジン	院内院外採用
アズレン含嗽用散0.4%「トワ」1.5g包	アズレン	院内院外採用
アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」(旧カナル)	アセトアミノフェン	院内院外採用
アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」(カルボロック後発)	アゼルニジピン	院内院外採用
アゾセמיד錠30mg「DSEP」(ダイト後発)	アゾセמיד	院内院外採用
アゾルガ配合懸濁性点眼液5mL	アリゾラミド・チロルマリン酸	院外採用
アダブチノール錠5mg	ヘレニエン	院外採用
アダラートCR錠10mg	ニフェジピン	院外採用
アダラートCR錠20mg	ニフェジピン	院外採用
アダラートCR錠40mg	ニフェジピン	院外採用
アタラックスPカプセル25mg	塩酸ヒドロキシジン	院内院外採用
アタラックス-PDシロップ2.5%(25mg/g)	ヒドロキシジンパモ酸塩	院内院外採用
アダリムマブBS皮下注40mgベン0.4mL「CTNK」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院内院外採用
アダリムマブBS皮下注80mgベン0.8mL「CTNK」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院内院外採用
アデスタン錠300mg	硝酸イソコナゾール	院内院外採用
アテノール錠25mg「ワイ」(テノミン後発)	アテノロール	院内院外採用
アデホスコーフ腸溶錠20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院内院外採用
アデホスコーフ腸溶錠60mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院外採用
アデホスコーフ顆粒10%(100mg/g)	アデノシン三リン酸二ナトリウム	院内院外採用
アテレック錠10mg	シルニジピン	院内院外採用
アテレック錠5mg	シルニジピン	院外採用
アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロール、フルチカゾン	院外採用
アドエア250デイスカス607リスター	サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオ	院内院外採用
アドエア500デイスカス607リスター	サルメテロールキシナホ酸塩、フルチカゾンプロピオ	院外採用
アドエア500エアゾール120吸入用	サルメテロール、フルチカゾン	院内院外採用
アドシルカ錠20mg	タダラフィル	院内院外採用
アドナ散100mg/g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	院内院外採用
アドフィードパップ40mg7枚/包	フルルピプロフェン	院内院外採用
アドベイト静注用キット1000	ルオコトコグアルファ(遺伝子組換え)	院内院外採用
アトモキセチン錠10mg「トワ」(ストラテラ後発)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
アトモキセチン錠25mg「トワ」(ストラテラ後発)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
アトモキセチン錠40mg「トワ」(ストラテラ後発)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
アトモキセチン錠5mg「トワ」(ストラテラ後発)	アトモキセチン塩酸塩	院外採用
アトラントクリーム10g	塩酸ネチコナゾール	院外採用
アトラント液10mL	塩酸ネチコナゾール	院外採用
アトラント軟膏10g	塩酸ネチコナゾール	院外採用
アトルバスタチンOD錠10mg「トワ」(リビートル10mg後発)	アトルバスタチンカルシウム	院内院外採用
アトルバスタチンOD錠5mg「トワ」(リビートル5mg後発)	アトルバスタチンカルシウム	院外採用
アトロピン点眼液1%5mL	硫酸アトロピン	院内院外採用
アトロピン硫酸塩水和物「和」原末	硫酸アトロピン	院内院外採用
アナストロゾール錠1mg「NK」(アリミデックス後発)	アナストロゾール	院内院外採用
アナフラニール錠10mg	塩酸クロミプラミン	院外採用
アナフラニール錠25mg	塩酸クロミプラミン	院内院外採用

アニューイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用	フルチゾンフランソカルボン酸エステル	院外採用
アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム/ヒランテロールトリフェニル酢酸塩	院内院外採用
アピドラ注ソロスター	インスリングルリジン	院外採用
アブストラル舌下錠100 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩	院内院外採用
アブストラル舌下錠200 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩	院外採用
アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g	トリアムシノロンアセトニド	院内院外採用
アプレビタント錠125mg「サワイ」(イメド後発)	アプレビタント	院内院外採用
アプレビタント錠80mg「サワイ」(イメド後発)	アプレビタント	院内院外採用
アベロックス錠400mg	塩酸モキシフロキサシン	院内院外採用
アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	院内院外採用
アマリール錠1mg	グリメピリド	院外採用
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」(アノロン後発)	アミオダロン塩酸塩錠	院内院外採用
アミティーザカプセル12 $\mu$ g	ルビプロストン	院内院外採用
アミティーザカプセル24 $\mu$ g	ルビプロストン	院内院外採用
アミノレバンEN配合散50g/包	肝不全用成分栄養剤	院内院外採用
アムロジピンOD錠2.5mg「トワ」(アムロジピンOD2.5mg後発)	アムロジピンベシル	院内院外採用
アムロジンOD錠5mg	ベシル酸アムロジピン	院外採用
アムロジンOD錠2.5mg	ベシル酸アムロジピン	院外採用
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」(リスミック後発)	アメジニウムメチル硫酸塩	院内院外採用
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル	院内院外採用
アモキシシリンカプセル250mg「トワ」(サシリン後発)	アモキシシリン水和物	院内院外採用
アラセナーA軟膏3%10g	ビダラビン	院外採用
アリッサ配合錠28錠/シート	エストロール水和物・ドロスピレノン	院外採用
アリドネパッチ27.5mg	ドネベジル	院外採用
アリピプラゾール錠12mg「サワイ」(エビリファイ後発)	アリピプラゾール	院内院外採用
アリピプラゾール錠1mg「サワイ」(エビリファイ後発)	アリピプラゾール	院内院外採用
アリピプラゾール錠3mg「サワイ」(エビリファイ後発)	アリピプラゾール	院内院外採用
アルケラン錠2mg	メルファラン	院外採用
アルサルミン細粒90%	スクラルファート	院内院外採用
アルダクトンA細粒10%(100mg/g)	スピロノラクトン	院内院外採用
アルダクトンA錠50mg	スピロノラクトン	院外採用
アルタットカプセル37.5mg	ロキサチジン	院外採用
アルタットカプセル7.5mg	塩酸ロキサチジンアセタート	院外採用
アルドメット錠125mg	メチルドパ	院外採用
アルドメット錠250mg	メチルドパ	院内院外採用
アルファカルシトール錠0.25 $\mu$ g「アノ」(アルファロール後発)	アルファカルシトール	院内院外採用
アルファカルシトール錠1.0 $\mu$ g「アノ」(アルファロール後発)	アルファカルシトール	院内院外採用
アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL	アルファカルシトール	院内院外採用
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」(ソナックス後発)	アルプラゾラム	院内院外採用
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	院内院外採用
アレジオンLX点眼液0.1%5mL	エピナスチン	院外採用
アレジオン眼瞼クリーム0.5%2g/本	エピナスチン塩酸塩	院外採用
アレビアチン錠100mg	フェニトイン	院内院外採用
アレベール吸入用溶解液0.125%100mL	チロキサポール	院内院外採用
アレンドロン酸錠35mg「日医工」(フォスマック/ボロン後発)	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院内院外採用
アローゼン顆粒	セソ葉,オノニス根乾燥エキス,セソ実,タラコ	院外採用
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院内院外採用
アロフト錠20mg	アクロファロン	院外採用
アロプリノール錠100mg「ニプロ」(旧アロントール)	アロプリノール	院内院外採用
アロマシン錠25mg	エキセメスタン	院内院外採用
アンカロン錠100	塩酸アミオダロン	院外採用
アンテベートクリーム0.05%5g	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院外採用

アンテベートローション10g	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院内院外採用
アンテベート軟膏0.05%5g	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	院内院外採用
アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	院内院外採用
アンプルロキソールシロップ 小児用0.3%「ト-7」(ムソルパ-ン後発)	アンプルロキソール塩酸塩	院内院外採用
アンプルロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」(ムソルパ-ン後発)	アンプルロキソール塩酸塩	院内院外採用
アンベック坐剤10mg	塩酸モルヒネ	院内院外採用
イーケプラドライシロップ50%500mg/g	レベチラセタム	院内院外採用
イーシー・ドパール配合錠	塩酸ベンゼラジド, レボドパ	院外採用
イオウカンフルローション	イオウ	院外採用
イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	院内院外採用
イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	院内院外採用
イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外採用
イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	院外採用
イクセロンパッチ13.5mg	リバスチグミン	院外採用
イクセロンパッチ18mg	リバスチグミン	院外採用
イクセロンパッチ4.5mg	リバスチグミン	院外採用
イクセロンパッチ9mg	リバスチグミン	院外採用
イコサント酸エチル粒状カプセル900mg「イコサ」(イコサ-ン後発)	イコササント酸エチル	院内院外採用
イスコチン錠100mg	イソニアジド	院内院外採用
イソジンガーグル液7%30mL	ポビドンヨード	院内院外採用
イソジンスクラブ液7.5%500mL	ポビドンヨード	院内院外採用
イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(イソソ-ド後発)	イソソルビド	院外採用
イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド	院内院外採用
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(イトラコ-ル後発)	イトラコナゾール	院内院外採用
イトリゾールカプセル50mg	イトラコナゾール	院内院外採用
イナビル吸入粉末剤20mg(20mg/キット)	オクタン酸ラニナミビル	院内院外採用
イニシンク配合錠(メホルミン500mg・アログリブチン25mg)	アログリブチン・メホルミン	院外採用
イソリット配合経腸用半固形剤300g/袋	経腸成分栄養剤半固形剤	院内院外採用
イノラス配合経腸用液187.5mL/袋	経腸成分栄養剤	院内院外採用
イフェクサーSRカプセル37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	院内院外採用
イフェクサーSRカプセル75mg	ベンラファキシン塩酸塩	院外採用
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「ト-7」(セロケ-ル後発)	イフェンプロジル酒石酸塩	院内院外採用
イブプロフェン錠100mg「NIG」(イブ-ル後発)	イブプロフェン	院内院外採用
イブランス錠125mg	バルボシクリブ	院外採用
イブランス錠25mg	バルボシクリブ	院外採用
イマチニブ錠100mg「イマニ」(イマニ-ック後発)	イマチニブメシル酸塩	院内院外採用
イミグラン点鼻液20mg0.1mL	スマトリプタン	院外採用
イムラン錠50mg	アザチオプリン	院内院外採用
イリボー錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外採用
イリボー錠5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外採用
イルトラ配合錠LD(イルベサルタン100mg・トリクロルメチアジド1mg)	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	院外採用
イルベサルタン錠100mg「DSPB」(イルベ-ル後発)	イルベサルタン	院内院外採用
インクレミンシロップ6mg/mL	ピロリン酸第二鉄	院内院外採用
インスリンアスパルトBS注射剤NR「サフィ」(インス-リット後続)	インスリンアスパルト	院外採用
インスリンアスパルトBS注射剤NR「サフィ」(インス-リット後続)	インスリンアスパルト	院内院外採用
インスリンゲルキノンBS注射剤「リリ」(インス後続)	インスリンゲルキノン(遺伝子組換え)	院外採用
インスリンゲルキノンBS注射剤「リリ」(インス後続)	インスリンゲルキノン(遺伝子組換え)	院内院外採用
インスリンリスプロBS注射剤100単位/mL HU「サフィ」10mL	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院外採用
インスリンリスプロBS注射剤HU「サフィ」(インス-リット後続)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院外採用
インスリンリスプロBS注射剤HU「サフィ」(インス-リット後続)	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	院内院外採用
インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩	院外採用
インテバンクリーム1%25g	インドメタシン	院内院外採用

インテバン外用液1% 50mL	インドメタシン	院外採用
インデラル錠10mg	塩酸プロプラノロール	院内院外採用
インフリーSカプセル200mg	インドメタシンファルネシル	院外採用
ウインタミン細粒100mg/g	塩酸クロルプロマジン	院外採用
ウテメリン錠5mg	塩酸リトドリン	院内院外採用
ウトロゲスタン腔用カプセル200mg	プロゲステロン	院外採用
ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ	院外採用
ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ	院外採用
ウブレチド錠5mg	臭化ジスチグミン	院内院外採用
ウラリット-U散1g/包	クエン酸カリウム, クエン酸ナト	院外採用
ウラリット配合錠	クエン酸カリウム, クエン酸ナト	院外採用
ウルグートカプセル200mg	塩酸ベネチレート, β-シクロヘキストリン包接	院外採用
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トワ」(カワ後発)	ウルソデオキシコール酸	院内院外採用
ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	院外採用
ウルソ顆粒50mg/g	ウルソデオキシコール酸	院内院外採用
ウルティプロ吸入用カプセル(7カプセル/シート)	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム	院内院外採用
ウレパールクリーム10% 20g	尿素	院外採用
ウレパールローション10% 20g	尿素	院外採用
エイベリス点眼液0.002%2.5mL	オミデネパグ イソプロピル	院外採用
エースコール錠2mg	塩酸テモカプリル	院外採用
エキザルベ5g	混合死菌浮遊液, ヒドロコルチゾ	院外採用
エクストラフローHME(7272)(20個/箱)	人工鼻	院外採用
エクストラフローHME(7291)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
エクストラベース(7265)(20枚入)	整形外科用テープ	院外採用
エクストラモイストHME(7273)(20個/箱)	人工鼻	院外採用
エクストラモイストHME(7290)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
エクセグラン散200mg/g	ゾニサミド	院内院外採用
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド	院内院外採用
エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	デブロドンプロピオン酸エステル	院内院外採用
エクラーローション10g	プロピオン酸デブロドン	院外採用
エコリシン眼軟膏 3.5g	ラクビオ酸エリスロマイシン, コリスチンメタンスル	院内院外採用
エスクレ坐剤250mg	抱水クロラル	院内院外採用
エスクレ坐剤500mg	抱水クロラル	院内院外採用
エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」(レキア後発)	エシタロプラムシュウ酸塩	院内院外採用
エズピクロン錠1mg「サワ」(ルネタ後発)	エズピクロン	院内院外採用
エストラーナテープ0.09mg	エストラジオール	院外採用
エストラーナテープ0.18mg	エストラジオール	院外採用
エストラーナテープ0.36mg	エストラジオール	院外採用
エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール	院外採用
エストラサイトカプセル156.7mg	リン酸エストラムフィンナトリウム	院外採用
エストリール錠1mg	エストリオール	院外採用
エストリール腔錠0.5mg	エストリオール	院内院外採用
エスワンタイホウ配合OD錠T20(ティーエスワン後発)	テガフル・ギメサル・オキシカルシウム	院内院外採用
エスワンタイホウ配合OD錠T25(ティーエスワン後発)	テガフル・ギメサル・オキシカルシウム	院内院外採用
エゼチミブ錠10mg「DSEP」(ゼチア後発)	エゼチミブ	院内院外採用
エソメプラゾールカプセル20mg「ニワ」(ネソム後発)	エソメプラゾール	院内院外採用
エタネルセプトBS皮下注50mg/1.0mL「日医工」	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外採用
エチゾラム錠0.5mg「SW」(エチゾラム錠0.5mg後発)	エチゾラム	院内院外採用
エチゾラム錠1mg「SW」(エチゾラム錠1mg後発)	エチゾラム	院内院外採用
エディロール錠0.75μg	エルデカルシトール	院外採用
エトドラク錠200mg「SW」(ハイブ後発)	エトドラク	院内院外採用
エナジア吸入用カプセル高用量 (7カプセル/シート)	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム/モメ	院外採用

エナジア吸入用カプセル中用量 (7カプセル/シート)	イソカテロール酢酸塩/グリコピロニウムモタ	院外採用
エナブリルマレイン酸塩錠2.5mg「トワ」(レニベース錠2.5後発)	エナブリルマレイン酸塩	院内院外採用
エナブリルマレイン酸塩錠5mg「トワ」(レニベース錠5後発)	エナブリルマレイン酸塩	院内院外採用
エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	院外採用
エネーボ配合経腸用液	経腸栄養剤 (半消化態)	院内院外採用
エパデールEMカプセル2g/包	イコサペント酸エチル	院外採用
エパデールS600mg/包	イコサペント酸エチル	院内院外採用
エパデールS900 (900mg/包)	イコサペント酸エチル	院外採用
エパデールカプセル300mg	イコサペント酸エチル	院外採用
エバミール錠1mg	ロルメタゼパム	院内院外採用
エバルスタット錠50mg「NP」(キネダック後発)	エバルレスタット	院外採用
エピビル錠150mg	ラミブジン	院内院外採用
エピプロスタット配合錠DB	オウメガサウ、ハコヤキ、セイヨウキナクサ等	院外採用
エピベン注射液0.15mg	エピネフリン	院外採用
エピベン注射液0.3mg	エピネフリン	院外採用
エピレオチン散50% (500mg/g)	エトサクシミド	院外採用
エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	院内院外採用
エフィエント錠3.75mg	プラスグレル	院内院外採用
エプツール錠250mg	塩酸エタンプトール	院内院外採用
エプランチルカプセル15mg	ウラピジル	院内院外採用
エプランチルカプセル30mg	ウラピジル	院外採用
エプレレノン錠25mg「杏林」(セララ後発)	エプレレノン	院内院外採用
エベリゾン塩酸塩錠50mg「トワ」(ミナル後発)	エベリゾン塩酸塩	院内院外採用
エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット	院内院外採用
エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット	院内院外採用
エボザックカプセル30mg	塩酸セビメリン	院外採用
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ (遺伝子組換え)	院内院外採用
エリキユース錠2.5mg	アビキサバン	院内院外採用
エリキユース錠5mg	アビキサバン	院内院外採用
エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン	院外採用
エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	院外採用
エレンタール配合内用剤80g/包	経腸栄養剤 (消化態)	院内院外採用
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物	院外採用
エンシュア・H250mL	経腸栄養剤 (半消化態)	院内院外採用
エンシュアリキッド250mL	経腸栄養剤 (半消化態)	院外採用
エンタカポン錠100mg「JG」(コム外後発)	エンタカポン	院内院外採用
エンテカビル錠0.5mg「トワ」(パラルド後発)	エンテカビル水和物	院内院外採用
エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド	院内院外採用
エンレスト錠50mg	サレトリンバルサルタンナトリウム水和物	院内院外採用
エンレスト錠100mg	サレトリンバルサルタンナトリウム水和物	院内院外採用
エンレスト錠200mg	サレトリンバルサルタンナトリウム水和物	院内院外採用
オイラックスクリーム10%10g	クロタミトン	院内院外採用
オーキシス9μgターベユヘイラー28吸入	ホルモテロール fumarate 塩酸水和物	院外採用
オーグメンチン配合錠250RS	クラブアン酸カリウム, アモキシシリン	院内院外採用
オキサロール軟膏25μg/g10g	マキサカルシトール	院外採用
オキサロール軟膏25μg/g10g	マキサカルシトール	院内院外採用
オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外採用
オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外採用
オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外採用
オキシドール3%500mL	オキシドール	院内院外採用
オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩	院外採用
オキノーム散2.5mg (0.5g包)	オキシコドン塩酸塩	院内院外採用

オキノーム散 20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外採用
オキノーム散 5mg (1g包)	オキシコドン塩酸塩	院内院外採用
オクトレオド 皮下注100 $\mu$ g「サド」1mL(サドスタチン後発)	酢酸オクトレオチド	院内院外採用
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	院内院外採用
オスバン消毒液10%500mL	塩化ベンザルコニウム	院内院外採用
オスポロット錠 200mg	スルチアム	院外採用
オゼックス錠 150mg	トシル酸トスフロキサシン	院外採用
オゼンピック皮下注 2mg	セマグルチド (遺伝子組換え)	院内院外採用
オダイン錠 125mg	フルタミド	院外採用
オテズラ錠 10mg	アプレミラスト	院外採用
オテズラ錠 20mg	アプレミラスト	院外採用
オテズラ錠 30mg	アプレミラスト	院外採用
オパルモン錠 5 $\mu$ g	リマゾスト, $\alpha$ -シクリン包接化合	院外採用
オビドレル皮下注シリンジ 250 $\mu$ g	コリオゴナドトロピン アルファ	院外採用
オフエブカプセル100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	院内院外採用
オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	院内院外採用
オプスミット錠 10mg	マシテンタン	院内院外採用
オプソ内服液 10mg/5mL包	塩酸モルヒネ	院外採用
オプソ内服液 5mg/2.5mL包	塩酸モルヒネ	院内院外採用
オプティダーム円形(7255)(20枚入)	整形外科用テープ	院外採用
オプティダーム楕円形(7256)(20枚入)	整形外科用テープ	院外採用
オプティダーム楕円形(7256JP)(15枚入)	整形外科用テープ	院外採用
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」(オメガ後発)	オメガ-3脂肪酸エチルカプセル	院内院外採用
オラベネム小児用細粒10%	テビベネム	院内院外採用
オランザピンOD錠5mg「アル」(ジブレン後発)	オランザピン	院内院外採用
オランザピン細粒1%「日新」10mg/g(ジブレン後発)	オランザピン	院内院外採用
オリーブ油	オリーブ油	院内院外採用
オルケディア錠1mg	エポカルセト	院内院外採用
オルケディア錠 2mg	エポカルセト	院外採用
オルケディア錠4mg	エポカルセト	院外採用
オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー-56吸入用	シクレソニド	院外採用
オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー-56吸入用	シクレソニド	院外採用
オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」(オルメテック後発)	オルメサルタン メドキシミル	院内院外採用
オルメテックOD錠5mg	オルメサルタンメドキシミル	院外採用
オレンシア皮下注125mgオトリンジェクター	アバタセプト	院内院外採用
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」(アロケグOD後発)	オロパタジン塩酸塩	院内院外採用
オロパタジン点眼液0.1%「サド」5mL(オロパタジン後発)	オロパタジン塩酸塩	院内院外採用
オングリザ錠5mg	サキサグリプチン水和物	院外採用
オンジェンティス錠 25mg	オピカポン	院外採用
オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g(7カプセルシート)	インダカテロール	院内院外採用
カイトリル錠 2mg	塩酸グラニセトロン	院内院外採用
ガスコン錠 40mg	ジメチルポリシロキサン	院内院外採用
ガスターD錠 20mg	ファモチジン	院外採用
ガスター錠 20mg	ファモチジン	院外採用
ガスマチン錠 5mg	クエン酸モサブリド	院外採用
カタリンK点眼液0.005% 15mL	ピレノキシシン	院外採用
ガチフロ点眼液0.3% 5mL	ガチフロキサシン	院外採用
カデックス軟膏0.9% 40g	ヨウ素	院内院外採用
カトレッパップ70mg 5枚入/包	インドメタシン	院外採用
カナグルOD錠100mg	カナグリフロジン水和物	院内院外採用
カナマイシンカプセル 250mg「明治」	硫酸カナマイシン	院外採用
カナリア配合OD錠(カガリフロジン100mg・テネグリアチン20mg)	テネグリアチン・カガリフロジン	院外採用

カバサル錠0.25mg	カベルゴリン	院外採用
カバサル錠1mg	カベルゴリン	院内院外採用
カフェイン水和物	カフェイン水和物	院外採用
カプトリル細粒5% (50mg/g)	カプトプリル	院内院外採用
カペシタビン錠300mg「ヤクルト」(セロダ後発)	カペシタビン	院内院外採用
カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	院外採用
カボメティクス錠60mg	カボザンチニブリンゴ酸塩	院外採用
カマ (酸化マグネシウム散)	酸化マグネシウム	院内院外採用
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(カモスタ後発)	カモスタットメシル酸塩	院内院外採用
カリメート錠92.59%5.4g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外採用
カリメート経口液20%25g/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院内院外採用
カリメート散5g包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院内院外採用
カルタンOD錠500mg	沈降炭酸カルシウム	院外採用
カルナクリン錠25	カリジゲナーゼ	院内院外採用
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トワ」(カルバゾ後発)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	院内院外採用
カルバマゼピン錠200mg「アメル」(テグレート後発)	カルバマゼピン	院内院外採用
カルブロック錠8mg	アゼルニジピン	院外採用
カルベジロール錠1.25mg「DSEP」(アチスト後発)	カルベジロール	院内院外採用
カルベジロール錠10mg「DSEP」(アチスト後発)	カルベジロール	院内院外採用
カルベジロール錠2.5mg「DSEP」(アチスト後発)	カルベジロール	院内院外採用
カルボシステイン錠50%「NIG」(ムコダイン後発)	カルボシステイン	院内院外採用
カルボシステイン錠250mg「トワ」(ムコダイン錠250mg後発)	カルボシステイン	院内院外採用
カレトラ配合錠	ロビナビル, リトナビル	院内院外採用
カロナールシロップ20mg/mL	アセトアミノフェン	院内院外採用
カロナール原末	アセトアミノフェン	院内院外採用
カンデサルタン錠8mg「あすか」(アロプリル後発)	カンデサルタン シレキセチル	院内院外採用
キシロカインゼリー2% 30mL	塩酸リドカイン	院内院外採用
キックリン顆粒86.2%862mg/g	ビキサロマー	院内院外採用
ギャバロン錠5mg	バクロフェン	院内院外採用
キャピリン配合錠(アスピリン100mg・ホリブロン10mg)	アスピリン/ホリブロンナフチル酸塩	院外採用
キャベジンUコーワ錠25mg	メチルメチオニンスルホニウムク	院外採用
キューバル100エアゾール	プロピオン酸ベクロメタゾン	院内院外採用
クービビック錠25mg	ダリドレキサント	院内院外採用
クービビック錠50mg	ダリドレキサント	院外採用
グーフィス錠5mg	エロピキシバット水和物	院内院外採用
クエチアピン細粒50%「タカ」(セロクエル後発)	クエチアピルフマル酸塩	院内院外採用
クエチアピン錠100mg「明治」(セロクエル後発)	クエチアピルフマル酸塩	院内院外採用
クエチアピン錠25mg「明治」(セロクエル後発)	クエチアピルフマル酸塩	院内院外採用
クエンメット配合散1g/包 (ウラリット後発)	クエン酸カルシウム・クエン酸ナトリウム水和物	院内院外採用
クエン酸第一鉄Na錠50mg「カワ」(フェロミア錠後発)	クエン酸第一鉄ナトリウム	院内院外採用
グラアルファ配合点眼液5mL	リバスジル塩酸塩/ブレンジソ酒石酸塩	院外採用
グラクティブ錠50mg	シタグリプチンリン酸	院外採用
グラケーカプセル15mg	メナテトレノン	院内院外採用
クラシエ人参養榮湯エキス細粒3.75g/包	人参養榮湯エキス	院外採用
クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒2.5g/包	半夏白朮天麻湯エキス	院外採用
グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス徐放カプセル	院内院外採用
グラセプターカプセル1mg	タクロリムス徐放カプセル	院内院外採用
グラナテック点眼液0.4%5mL	リバスジル塩酸塩水和物	院内院外採用
グラニセトロン内服2mgゼリー「カミファ」(カイトリル後発)	グラニセトロン塩酸塩	院内院外採用
グラマリール錠25mg	塩酸チアプリド	院内院外採用
クラリス錠10%小児用100mg/g	クラリスロマイシン	院外採用
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカ」(クラリッドDS後発)	クラリスロマイシン	院内院外採用

クラリスロマイシン錠200mg「効効」(ケリス後発)	クラリスロマイシン	院内院外採用
クラリスロマイシン錠小児用50mg「効効」(ケリス後発)	クラリスロマイシン	院内院外採用
クラリス錠200mg	クラリスロマイシン	院外採用
クラリチンレディタブ錠10mg	ロラタジン	院外採用
グランダキシシン錠50mg	トフィソパム	院内院外採用
クリアミン配合錠A1.0	酒石酸エロダミン, 無水カフェイン, イソブ	院外採用
グリセリン「ケンエー」	グリセリン	院外採用
グリセリン洗腸液50%「ケンエー」120mL(旧ケンエー-G)	グリセリン	院内院外採用
グリセリン洗腸液50%「ケンエー」30mL(旧ケンエー-G)	グリセリン	院内院外採用
グリセリン洗腸液50%「ケンエー」60mL(旧ケンエー-G)	グリセリン	院内院外採用
グリチロン配合錠	グリチルチン, メチオン, グリシン	院内院外採用
グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド	院外採用
グリミクロン錠40mg	グリクラジド	院内院外採用
グリメピリド錠1mg「杏林」(アマール後発)	グリメピリド	院内院外採用
グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン	院内院外採用
グルコンサンK細粒4mgEq/g	グルコン酸カリウム	院内院外採用
グルコンサンK錠5mgEq	グルコン酸カリウム	院外採用
グルファストOD錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	院外採用
グルベス配合OD錠(ミチグリニド10mg・ボグリボース0.2mg)	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース	院外採用
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン	院内院外採用
クレナフィン爪外用液10%3.56g(4mL)/本	エフィナコナゾール	院内院外採用
クレナフィン爪外用液10%7.12g(8mL)/本	エフィナコナゾール	院外採用
クレメジン細粒分包2g	炭素	院外採用
クレメジン速崩錠500mg(4錠/包)	球形吸着炭	院内院外採用
グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン	院外採用
グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン	院外採用
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」(リーゼ後発)	クロチアゼパム	院内院外採用
クロトリマゾール錠100mg「F」(エンペシド後発)	クロトリマゾール	院内院外採用
クロピドグレル錠25mg「SANIK」(グレビックス後発)	クロピドグレル硫酸塩	院内院外採用
クロピドグレル錠75mg「SANIK」(グレビックス後発)	クロピドグレル硫酸塩	院内院外採用
クロベタゾールプロピオン酸軟膏0.05%「MYK」5g(デルモベート後発)	クロベタゾールプロピオン酸エステル	院内院外採用
クロベタゾールプロピオン酸軟膏0.05%「MYK」10g(デルモベート後発)	プロピオン酸クロベタゾール	院内院外採用
クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール	院内院外採用
クロミッド錠50mg	クエン酸クロミフェン	院外採用
ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外採用
ケイキサレートドライシロップ76%3.27g包	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	院外採用
ケイツーカプセル5mg	メナテトレノン	院内院外採用
ケイツーシロップ0.2%1mL包	メナテトレノン	院内院外採用
ゲーベンクリーム1%100g	スルファジアジン銀	院内院外採用
ゲーベンクリーム1%500g	スルファジアジン銀	院内院外採用
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	院外採用
ケトプロフェン40mg「テイク」7枚/袋(モラス後発)	ケトプロフェン	院内院外採用
ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」(レツサ後発)	ゲフィチニブ	院外採用
ケプザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院外採用
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシン	院外採用
ケフレックスシロップ用細粒100	セファレキシン	院内院外採用
ケラチナミンクリーム20%25g	尿素	院内院外採用
ケレンディア錠10mg	フィネレノン	院内院外採用
ケレンディア錠20mg	フィネレノン	院内院外採用
ゲンタシンクリーム0.1%10g	硫酸ゲンタマイシン	院外採用
ゲンタシン軟膏0.1%10g	硫酸ゲンタマイシン	院外採用
ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニト」5mL	ゲンタマイシン硫酸塩	院内院外採用

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g (ゲンタシン軟膏後発)	ゲンタマイシン硫酸塩	院内院外採用
コートリル錠 10mg	ヒドロコルチゾン	院内院外採用
コスパノン錠 40mg	フロプロピオン	院内院外採用
コスパノン錠 80mg	フロプロピオン	院外採用
コセンテックス皮下注150mgペン	セクキヌマブ	院外採用
コセンテックス皮下注300mgペン	セクキヌマブ	院外採用
コソプト 配合点眼液 5mL	塩酸トルゾラミド / マレイン酸フェロール	院外採用
コデインリン酸塩散10%	リン酸コデイン	院内院外採用
コデインリン酸塩錠20mg	コデインリン酸塩	院内院外採用
ゴナールエフ皮下注ペン150	フォリトロピン アルファ	院内院外採用
ゴナールエフ皮下注ペン 300	フォリトロピン アルファ	院内院外採用
ゴナールエフ皮下注ペン 450	フォリトロピンアルファ	院外採用
ゴナールエフ皮下注ペン 900	フォリトロピンアルファ	院外採用
コニール錠 2mg	ベニジピン	院外採用
コムクロシャンブー0.05%	クロタリールポロキサニルエステル	院外採用
コムレクス耳科用液 1.5% 5mL/本	レボフロキサシン水和物	院内院外採用
コメリアンコーワ錠 50mg	塩酸ジラゼブ	院外採用
コラン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院内院外採用
コラン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	院外採用
コルヒチン錠 0.5mg 「タカタ」	コルヒチン	院内院外採用
コレクチム軟膏0.25% 5g	デルゴシチニブ	院外採用
コレクチム軟膏0.5% 5g	デルゴシチニブ	院内院外採用
コレバイン錠 500mg	コレステミド	院内院外採用
コンサータ錠 18mg	塩酸メチルフェニデート	院外採用
コンサータ錠 27mg	塩酸メチルフェニデート	院外採用
コンスタン錠0.4mg	アルプラゾラム	院外採用
コントミン糖衣錠 12.5mg	塩酸クロルプロマジン	院外採用
コントミン糖衣錠 25mg	塩酸クロルプロマジン	院内院外採用
コンブラビン配合錠 (アスピリン100mg・クロピドグレル75mg)	クロピドグレル/アスピリン	院外採用
ザーネ軟膏 0.5%	ビタミンA	院内院外採用
サアミオン錠 5mg	ニセルゴリン	院外採用
ザイザルシロップ0.05% (0.5mg/mL)	レボセチリジン塩酸塩	院外採用
ザイティガ錠 250mg	アピラテロン酢酸エステル	院外採用
ザイティガ錠 500mg	アピラテロン酢酸エステル	院外採用
サイトテック錠 100ug	ミソプロストール	院外採用
サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	院外採用
ザジテン点眼液0.05% 5mL	フマル酸ケトチフェン	院内院外採用
ザジテン点鼻液0.05% 8mL	フマル酸ケトチフェン	院外採用
ザファテック錠 100mg	トレラグリプチンコハク酸塩	院外採用
ザファテック錠50mg	トレラグリプチンコハク酸塩	院外採用
サムスカOD錠7.5mg	トルバブタン	院外採用
サムスカ顆粒1%	トルバブタン	院内院外採用
サムフレール内用懸濁液15% 750mg/包	アトバコン	院内院外採用
ザラカム配合点眼液2.5mL/瓶	タゾロスタ / マレイン酸フェロール	院内院外採用
サラジェン錠 5mg	ピロカルピン塩酸塩	院内院外採用
サラジェン顆粒0.5% (5mg/包)	ピロカルピン塩酸塩	院外採用
サラゾピリン錠 500mg	サラゾスルファピリジン	院外採用
サリチル酸ワセリン軟膏 5%	サリチル酸	院内院外採用
サリベートエアゾール50g	人工唾液	院内院外採用
サルタノールインヘラー 13.5mL	硫酸サルブタモール	院外採用
ザルティア錠5mg	タダラフィル	院内院外採用
カルボグレレート塩酸塩錠100mg 「オーハラ」 (アソブレーグ 後発)	サルボグレレート塩酸塩	院内院外採用

サワシリンカプセル250mg	アモキシシリン	院外採用
サワシリン細粒10% (100mg/g)	アモキシシリン	院外採用
サンコバ点眼液0.02% 5mL	シアノコバラミン	院外採用
サンピロ点眼液1% 5mL	塩酸ピロカルピン	院内院外採用
サンピロ点眼液2% 5mL	塩酸ピロカルピン	院内院外採用
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%5mL/本(リンデロン後発)	ベタメタゾン酢酸エステルナトリウム	院内院外採用
ジアゼパム錠2mg「アメル」(セルシン後発)	ジアゼパム	院内院外採用
ジアゼパム錠5「トーフ」(ホリゾン後発)	ジアゼパム	院内院外採用
シアリス錠10mg	タダラフィル	院外採用
ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン	院内院外採用
ジェノトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン	院外採用
ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン	院外採用
ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチンダイオールの	院外採用
ジクロキシムスルホサキネート耳科用液5%「CEO」10mL	ジクロキシムスルホサキネート	院内院外採用
ジクアスLX点眼液3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	院外採用
ジクアス点眼液3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	院内院外採用
ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
シグマート錠5mg	ニコランジル	院外採用
シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	院内院外採用
シクロスポリンカプセル10mg「サド」(ネオール後発)	シクロスポリン	院内院外採用
シクロスポリンカプセル25mg「サド」(ネオール後発)	シクロスポリン	院内院外採用
ジクロフェナクNa錠1%「ラケル」50g(ホルタレナ後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」(ホルタレナ後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」(ホルタレナ後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」(ホルタレナ後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」(ホルタレナ後発)	ジクロフェナクナトリウム	院内院外採用
ジゴシン散1mg/g	ジゴキシン	院外採用
ジスロマックカプセル100mg	アジスロマイシン	院外採用
ジスロマック細粒小児用10% (100mg/g)	アジスロマイシン	院内院外採用
シナール配合錠	アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム	院内院外採用
シナール配合顆粒1g/包	アスコルビン酸、パントテン酸カルシウム	院内院外採用
ジピリダモール散12.5%「JG」	ジピリダモール	院外採用
ジピリダモール錠25mg「トーフ」(バルサンチン後発)	ジピリダモール	院内院外採用
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーフ」(セファドール後発)	ジフェニドール	院内院外採用
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾール	院外採用
ジフルカンカプセル50mg	フルコナゾール	院外採用
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イキ」(マイグ後発) 10g	ジフルプレドナート	院内院外採用
シプロキサン錠200mg	塩酸シプロフロキサシン	院内院外採用
シベノール錠100mg	コハク酸シベンゾリン	院外採用
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サウ」(シベノール後発)	シベンゾリンコハク酸塩	院内院外採用
シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルリズマブベコル(遺伝子組換え)	院外採用
シムビコートクヒューハイ60吸入	ブデソニド、フル酸ホルモテロール	院内院外採用
ジメチコン内用液2%「サウ」300mL(カスコン後発)	ジメチコン	院内院外採用
ジャディアン錠10mg	エンパグリフロジン	院内院外採用
ジャディアン錠25mg	エンパグリフロジン	院外採用
ジャヌビア錠25mg	シタグリプチンリン酸	院外採用
ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸	院内院外採用
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サウ」(コリアン後発)	ジラゼブ塩酸塩水和物	院内院外採用
ジレックドライシロップ1.25% (12.5mg/g)	セチリジン塩酸塩	院外採用
シロスタゾールOD錠100mg「サウ」(ブクタール後発)	シロスタゾール	院内院外採用
シロドシンOD錠4mg「DSEP」(クリフ後発)	シロドシン	院内院外採用
ジンタス錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	院内院外採用

シンバスタチン錠5mg「VTRS」(リボパス後発)	シンバスタチン	院外採用
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	院外採用
シンメトレル錠50mg	塩酸アマンタジン	院内院外採用
スイニー錠100mg	アナグリプチン	院外採用
スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	院内院外採用
スーグラ錠25mg	イブラグリフロジン L-プロリン	院外採用
スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	院内院外採用
スージャヌ配合錠(イブラグリフロジン50mg・シタグリプチン50mg)	シタグリプチン・イブラグリフロジン	院外採用
ステントカプセル12.5mg	リンゴ酸スニチニブ	院外採用
スタデルムクリーム5%10g	イブプロフェンピコノール	院外採用
スタビリベース(7289)(15枚入)	整形外科用テープ	院外採用
スタビリベースオプティダーム(7318)(15枚入)	整形外科用テープ	院外採用
スタレボ配合錠L100	レボドパ/カルビドパ/エンカホン	院外採用
スタレボ配合錠L50	レボドパ/カルビドパ/エンカホン	院外採用
スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ	院外採用
ステリクロンR液0.5%	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外採用
ステリクロンW液0.05%	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外採用
ステリクロンW液0.5%	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外採用
ステロネマ注腸3mg100mL/個	リン酸ベタメタゾンナトリウム	院外採用
ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド・塩酸パバペリン	院外採用
ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン	院外採用
スピール膏M	サリチル酸	院内院外採用
スピオルトレスピマット60吸入	トリクロロ臭化物・トリクロロ塩酸塩	院内院外採用
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	臭化チオトロピウム水和物	院内院外採用
スピリーバ吸入用18μg(7カプセル/シート)	チオトロピウム臭化物水和物	院外採用
スピロノラクトン錠25mg「NP」(アルダクトンA後発)	スピロノラクトン	院内院外採用
スピロベント錠10μg	塩酸クレンプテロール	院外採用
ズファジラン錠10mg	塩酸イソクスプリン	院外採用
スベリア錠200mg(クリアナール同成分)	フドステイン	院内院外採用
スルピリド錠50mg「サワイ」(トゲマール後発)	スルピリド	院内院外採用
セイブル錠25mg	ミグリトール	院外採用
ゼジュラ錠100mg	ニラパリプトシル酸塩水和物	院外採用
ゼスラン錠3mg	メキタジン	院外採用
セタネオ点眼液0.002%2.5mL/本	セバタプロスト	院外採用
セディール錠10mg	クエン酸タンドスピロン	院外採用
セトロタイド注射用0.25mg(溶解液付)	セトロレリクス酢酸塩	院内院外採用
セバゾン散10mg/g	クロキサゾラム	院内院外採用
セバゾン錠1mg	クロキサゾラム	院外採用
セバゾン錠2mg	クロキサゾラム	院内院外採用
セパミット-R細粒2%(20mg/g)	ニフェジピン	院内院外採用
ゼビアックスローション2%10g	オゼノキサシン	院外採用
ゼビアックス油性クリーム2%10g	オゼノキサシン	院外採用
セファランチン末10mg/g	セファランチン	院内院外採用
セファレキシカプセル250mg「ト-7」(ケフレックス後発)	セファレキシム	院外採用
ゼフィックス錠100mg	ラミブジン	院外採用
ゼフナートクリーム2%10g	リラナフタート	院外採用
ゼフナート外用液2%10mL	リラナフタート	院外採用
セルセプトカプセル250mg	ミコフェノール酸モフェチル	院内院外採用
セルタッチパップ706枚/包	フェルピナク	院外採用
セルトラリン錠25mg「JG」(ジェイロフ後発)	セルトラリン塩酸塩	院内院外採用
セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外採用
セルベックスカプセル50mg	テブレノン	院外採用

セルベックス細粒100mg/g	テブレノン	院外採用
セレコキシブ錠100mg「VTRS」(セロックス後発)	セレコキシブ	院内院外採用
セレスタミン配合錠	d-メチル酸カルフェニミン, ベタメタゾン	院内院外採用
セレニカR顆粒400mg/g	バルプロ酸ナトリウム	院内院外採用
セレネース細粒10mg/g	ハロペリドール	院外採用
セレベント50ディスカス	キシナホ酸サルメテロール	院外採用
セロクラール錠10mg	酒石酸イフェンプロジル	院外採用
ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	院外採用
センノシド錠12mg「ト-7」(ブデソニド錠後発)	センノシド	院内院外採用
ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン (遺伝子組換え)	院外採用
ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン (遺伝子組換え)	院外採用
ソセゴン錠25mg	塩酸ペンタゾシン	院外採用
ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」(ソタロール後発)	ソタロール塩酸塩	院内院外採用
ゾピラックス眼軟膏3% 5g	アシクロビル	院内院外採用
ゾピラックス錠200mg	アシクロビル	院外採用
ゾピラックス錠400	アシクロビル	院外採用
ソフラチュール貼付剤10cm (10×10cm/枚)	硫酸フラジオマイシン	院内院外採用
ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	院内院外採用
ソマトロピンBS皮下注5mg「サト」シニアール	ソマトロピン (遺伝子組換え)	院外採用
ソラナックス錠0.4mg	アルプラゾラム	院外採用
ソランタール錠100mg	塩酸チアラミド	院外採用
ソリクア配合注ソロスター	イソリンゲラギン・リクセチド	院外採用
ソリフェナシロ酸塩OD錠5mg「ト-7」(ソリフェナシロ酸後発)	コハク酸ソリフェナシン	院内院外採用
ソルコーテフ注射用100mg (注射用水 2mL付)	ヒドコロチゲノコハク酸エステルナトリウム	院内院外採用
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	イソリンゲラゲク・リラゲルチド	院外採用
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ソリ」(マイスリ後発)	ゾルピデム酒石酸塩	院内院外採用
ダブロック錠2mg	ダブロデュスタット	院内院外採用
ダブロック錠4mg	ダブロデュスタット	院内院外採用
ダイアート錠30mg	アゾセミド	院外採用
ダイアップ坐剤10mg	ジアゼパム	院内院外採用
ダイアップ坐剤4mg	ジアゼパム	院内院外採用
ダイアップ坐剤6mg	ジアゼパム	院内院外採用
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	院内院外採用
ダイアモックス末	アセタゾラミド	院外採用
ダイオウ末	ダイオウ	院外採用
ダイドロネル錠200mg	エチドロン酸二ナトリウム	院外採用
ダイフェン配合錠(ハク後発)	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	院内院外採用
タガメット錠200mg	シメチジン	院外採用
タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	院内院外採用
タクロリムス錠0.5mg「ト-7」(ブデソニド錠後発)	タクロリムス水和物	院外採用
タクロリムス錠1.5mg「ト-7」(ブデソニド錠後発)	タクロリムス水和物	院外採用
タクロリムス錠1mg「ト-7」(ブデソニド錠後発)	タクロリムス水和物	院外採用
タクロリムス錠2mg「ト-7」(ブデソニド錠後発)	タクロリムス水和物	院外採用
タクロリムス錠3mg「ト-7」(ブデソニド錠後発)	タクロリムス水和物	院外採用
タケキャブ錠10mg	ポノプラザンフマル酸塩	院内院外採用
タケキャブ錠20mg	ポノプラザンフマル酸塩	院内院外採用
タプロコム配合点眼液 2.5mL	タフルプロスト/フルメドニド酒石酸塩	院内院外採用
タプロス点眼液0.0015% 2.5mL	タフルプロスト	院内院外採用
タベジール錠1mg	フマル酸クレマスチン	院外採用
タミフルDS30mg/g	リン酸オセルタミビル	院内院外採用
タミフルカプセル75mg	リン酸オセルタミビル	院内院外採用
タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ソリ」(ハルナール後発)	タムスロシン	院内院外採用

ダラシンTゲル1%10g	リン酸クリンダマイシン	院内院外採用
ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン	院内院外採用
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外採用
タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院内院外採用
タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外採用
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院内院外採用
タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g	オフロキサシン	院内院外採用
タリビッド耳科用液0.3% 5mL	オフロキサシン	院外採用
タリビッド点眼液0.3% 5mL	オフロキサシン	院外採用
タルセバ錠150mg	エルロチニブ	院外採用
タルチレリンOD錠5mg「アム」(セレジスト後発)	タルチレリン水和物	院内院外採用
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トワ」(セディール後発)	タンドスピロンクエン酸塩	院内院外採用
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム	院内院外採用
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末(旧タナリン)	タンニン酸アルブミン	院内院外採用
タンボコール錠50mg	酢酸フレカイニド	院外採用
チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル	院内院外採用
チオラ錠100mg	チオプロニン	院外採用
チガソンカプセル10mg	エトレチナート	院外採用
チガソンカプセル25mg	エトレチナート	院外採用
チキジウム臭化物カプセル10mg「カイ」(ファトン後発)	チキジウム臭化物	院内院外採用
チザニジン錠1mg「日医工」(テルネリン後発)	チザニジン塩酸塩	院内院外採用
チモプトール点眼液0.5% 5mL	マレイン酸チモロール	院内院外採用
チャンピックス錠0.5mg	酒石酸バレニクリン	院外採用
チャンピックス錠1mg	酒石酸バレニクリン	院外採用
チラーヂンS散0.01%	レボチロキシシンナトリウム	院内院外採用
チラーヂンS錠12.5μg	レボチロキシシンナトリウム	院外採用
チラーヂンS錠25	レボチロキシシンナトリウム	院内院外採用
チラーヂンS錠50	レボチロキシシンナトリウム	院内院外採用
チロナミン錠25ug	リオチロニンナトリウム	院外採用
ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	院内院外採用
ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外採用
ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	院内院外採用
ツムラ100大建中湯2.5g包	大建中湯	院内院外採用
ツムラ106温経湯2.5g包	ツムラ106温経湯2.5g包	院外採用
ツムラ107牛車腎気丸2.5g包	牛車腎気丸	院内院外採用
ツムラ108人參養栄湯3.0g包	人參養栄湯	院内院外採用
ツムラ10柴胡桂枝湯2.5g包	柴胡桂枝湯	院外採用
ツムラ111清心蓮子飲2.5g包	清心蓮子飲	院外採用
ツムラ114柴苓湯3.0g包	ツムラ114柴苓湯3.0g包	院内院外採用
ツムラ11柴胡桂枝乾姜湯2.5g包	柴胡桂枝乾姜湯	院外採用
ツムラ12柴胡加竜骨牡蠣湯2.5g包	柴胡加竜骨牡蠣湯	院内院外採用
ツムラ134桂枝加芍薬大黄湯2.5g包	桂枝加芍薬大黄湯	院外採用
ツムラ137加味帰脾湯2.5g包	加味帰脾湯	院外採用
ツムラ138桔梗湯2.5g包	漢方製剤	院外採用
ツムラ14半夏瀉心湯2.5g包	半夏瀉心湯	院内院外採用
ツムラ15黄連解毒湯2.5g包	黄連解毒湯	院外採用
ツムラ16半夏厚朴湯2.5g包	半夏厚朴湯	院内院外採用
ツムラ17五苓散2.5g包	五苓散	院内院外採用
ツムラ18桂枝加朮附湯2.5g包	桂枝加朮附湯	院外採用
ツムラ19小青竜湯3.0g包	小青竜湯	院内院外採用
ツムラ1葛根湯2.5g包	ツムラ1葛根湯	院内院外採用
ツムラ20防己黄耆湯2.5g包	防己黄耆湯	院外採用

ツムラ23当帰芍薬散2.5g包	当帰芍薬散	院内院外採用
ツムラ24加味逍遙散2.5g包	加味逍遙散	院内院外採用
ツムラ25桂枝茯苓丸2.5g包	桂枝茯苓丸	院内院外採用
ツムラ29麦門冬湯3.0g包	麦門冬湯	院内院外採用
ツムラ31呉茱萸湯2.5g包	呉茱萸湯	院外採用
ツムラ34白虎加人参湯3.0g包	ツムラ34白虎加人参湯	院内院外採用
ツムラ38当帰四逆加呉茱萸生姜湯2.5g包	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯	院外採用
ツムラ39苓桂朮甘湯2.5g包	ツムラ39苓桂朮甘湯2.5g包	院外採用
ツムラ40猪苓湯2.5g包	猪苓湯	院内院外採用
ツムラ41補中益気湯2.5g包	補中益気湯	院内院外採用
ツムラ43六君子湯2.5g包	ツムラ43六君子湯2.5g包	院内院外採用
ツムラ47釣藤散2.5g包	釣藤散	院外採用
ツムラ48十全大補湯2.5g包	十全大補湯	院内院外採用
ツムラ51潤腸湯2.5g包	潤腸湯	院外採用
ツムラ54抑肝散2.5g包	抑肝散	院内院外採用
ツムラ56五淋散2.5g包	五淋散	院外採用
ツムラ57温清飲2.5g包	ツムラ57温清飲2.5g包	院外採用
ツムラ62防風通聖散2.5g包	防風通聖散	院外採用
ツムラ68芍薬甘草湯2.5g包	芍薬甘草湯	院内院外採用
ツムラ60味敗毒湯2.5g包	十味敗毒湯	院外採用
ツムラ70香蘇散2.5g包	香蘇散エキス	院外採用
ツムラ78味地黄丸2.5g包	八味地黄丸	院内院外採用
ツムラ89治打撲一方2.5g包	治打撲一方	院内院外採用
ツムラ90清肺湯3.0g包	清肺湯	院外採用
ツムラ96柴朴湯2.5g包	柴朴湯	院外採用
ツムラ99小建中湯2.5g包	小建中湯	院内院外採用
ツムラ9小柴胡湯2.5g包	小柴胡湯	院外採用
ツルバダ配合錠	エトリンピオン、フマル酸テノヒルジソプロキ	院内院外採用
ティーエスワン配合OD錠T20	テカフル、ギメシル、チラシルカリウム	院外採用
ティーエスワン配合OD錠T25	テカフル、ギメシル、チラシルカリウム	院外採用
ディフェリングル0.1%15g	アダパレン	院内院外採用
デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	院内院外採用
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	院内院外採用
テオドール錠100mg	テオフィリン	院内院外採用
テオドール錠200mg	テオフィリン	院外採用
テオフィリン徐放ドライブツ小児用20%「サウ」(テオドール後発)	テオフィリン	院内院外採用
テオロング錠100mg	テオフィリン	院外採用
デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	院内院外採用
デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	院内院外採用
デキサメゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5g(旧デキサル)	デキサメタゾン	院内院外採用
デキストロメトラン錠15mg「ト-7」(メジコン後発)	デキストロメトラン臭化水素	院内院外採用
テグレート細粒500mg/g	カルバマゼピン	院内院外採用
テグレート錠100mg	カルバマゼピン	院外採用
テグレート錠200mg	カルバマゼピン	院外採用
デザレックス錠5mg	デスロラタジン	院内院外採用
テシプール錠1mg	マレイン酸セチプチリン	院内院外採用
デスバコーワ口腔用クリーム5g	塩酸カルヘキシジン、リカル酸ジフェンドラミ	院外採用
デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリク」	デスマプレシン酢酸塩水和物	院内院外採用
デタントールR錠3mg	塩酸ブナゾシン	院外採用
デタントール点眼液0.01%5mL	塩酸ブナゾシン	院内院外採用
テトラミド錠10mg	塩酸ミアンセリン	院内院外採用
テトラミド錠30mg	塩酸ミアンセリン	院内院外採用

テネリアOD錠20mg	テネグ リブ 臭化水素酸塩水和物	院内院外採用
テネリアOD錠40mg	テネグ リブ 臭化水素酸塩水和物	院外採用
テノゼット錠300mg	テノホビル	院外採用
デノタスチュアブル配合錠	炭酸カルシウム・マグネシウム/コレカルチフェロール	院内院外採用
デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	院外採用
デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	院内院外採用
デパケンシロップ5%(50mg/mL)	バルプロ酸ナトリウム	院内院外採用
デパケン細粒40%(400mg/g)	バルプロ酸ナトリウム	院内院外採用
デパケン錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	院外採用
デパケン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	院外採用
デバス細粒1%(10mg/g)	エチゾラム	院内院外採用
デバス錠0.5mg	エチゾラム	院外採用
テピケイ錠50mg	ドルテグラビル	院内院外採用
テプレノカプセル50mg「トワ」(セルベックス後発)	テプレノン	院内院外採用
テプレノ細粒100mg/g「トワ」(セルベックス細粒後発)	テプレノン	院内院外採用
デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	院外採用
テモゾロミド錠100mg「NK」(テモダール後発)	テモゾロミド	院内院外採用
テモゾロミド錠20mg「NK」(テモダール後発)	テモゾロミド	院内院外採用
デュアック配合ゲル10g	クリンダマイシン・過酸化ベンゾイルゲル	院外採用
デュオトラバ配合点眼剤2.5mL/瓶	トラボプロスト、チモロール	院外採用
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	院内院外採用
デュロキセチンカプセル20mg「明治」(サイハール後発)	デュロキセチン塩酸塩	院内院外採用
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)25g	塩酸オキシテトラサイクリン	院内院外採用
テリパチドBS皮下注射キット600μg「モチダ」	テリパチド(遺伝子組換え)	院外採用
テリパチド皮下注射28.2μgオトインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院内院外採用
テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エ	院外採用
テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾン/クメクリニウム/ビランテロール	院内院外採用
テルピナフィン錠125mg「VTRS」(ラミシル後発)	テルピナフィン塩酸塩	院内院外採用
テルミサルタン錠40mg「三和」(ミカルディス後発)	テルミサルタン	院内院外採用
トアラセット配合錠「Me」(トアラセット後発)	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	院内院外採用
ドキサゾシン錠1mg「トワ」(カルテナリ後発)	ドキサゾシンメシル酸塩	院内院外採用
ドグマチール細粒50%	スルピリド	院外採用
ドグマチール錠100mg	スルピリド	院外採用
ドグマチール錠200mg	スルピリド	院外採用
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トワ」(トコラン後発)	トコフェロールニコチン酸エステル	院内院外採用
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トワ」(トコラ後発)	トコフェロール酢酸エステル	院内院外採用
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「アム」(アリセプト後発)	ドネベジル塩酸塩	院内院外採用
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「アム」(アリセプト後発)	ドネベジル塩酸塩	院内院外採用
ドパコール配合錠L100(メネシット後発)	レボドパ・カルビドパ水和物	院内院外採用
トビエース錠4mg	フェンテロジンフマル酸塩	院外採用
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	院内院外採用
ドプスOD錠200mg	ドロキシドパ	院内院外採用
トフラニール錠10mg	塩酸イミプラミン	院外採用
ドボネックス軟膏50μg/g10g	カルシポトリオール	院外採用
ドボベットのゲル15g	カルシポトリオール・ベタメタゾン	院外採用
ドボベットのフォーム60g	カルシポトリオール・ベタメタゾン・プロピオン	院外採用
ドボベットの軟膏15g	カルシポトリオール・ベタメタゾン・プロピオン	院内院外採用
ドラル錠15mg	クアゼパム	院外採用
トラセミドOD錠4mg「TE」(ルブラック後発)	トラセミド	院内院外採用
トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	院内院外採用
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」(テジレル後発)	トラゾドン塩酸塩	院内院外採用
トラテニアス配合錠AP(リナグリプチン5mg・エンパグリフロジン10mg)	エンパグリフロジン・リナグリプチン	院外採用

トラネキサム酸錠250mg「日医工」(トランサミン後発)	トラネキサム酸	院内院外採用
トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL	トラボプロスト	院内院外採用
トラベルミン配合錠	リルピリン・フェニトリン	院内院外採用
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 10mL/本	塩酸トラマゾリン	院内院外採用
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(トマル後発)	トラマドール塩酸塩	院内院外採用
トランサミン散5.0% (500mg/g)	トラネキサム酸	院内院外採用
トリアゾラム錠0.125mg「日医工」(ルソロン後発)	トリアゾラム	院内院外採用
トリクロロメチアジド錠1mg「トワ」(フルイトラン後発)	トリクロロホスナトリウム	院内院外採用
トリクロロメチアジド錠2mg「NIG」(フルイトラン後発)	トリクロロメチアジド	院内院外採用
トリプタノール錠10mg	塩酸アミトリプチリン	院内院外採用
トリプタノール錠25mg	塩酸アミトリプチリン	院内院外採用
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アム」(アテン後発)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	院内院外採用
トリメチン酸塩錠100mg「トワ」(セレキノロン後発)	マレイン酸トリメブチン	院内院外採用
トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外採用
トルソプト点眼液1% 5mL	塩酸ドルゾラミド	院内院外採用
トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセキズマブ	院外採用
ドルナー錠20ug	ペラプロストナトリウム	院内院外採用
トルバプタンOD錠7.5mg「オツカ」(サムス後発)	トルバプタン	院内院外採用
ドルモロール配合点眼液「TS」 5mL (コゾト後発)	ドルゾラミド・チモロール	院内院外採用
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	院内院外採用
トレスーバ注フレックスタッチ	インスリン デクルデク	院内院外採用
トレドミン錠25mg	塩酸ミルナシبران	院内院外採用
トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院内院外採用
トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外採用
ドンペリドン錠10mg「日新」(ナベリン後発)	ドンペリドン	院内院外採用
ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	院内院外採用
ナウゼリン坐剤10mg	ドンペリドン	院内院外採用
ナウゼリン坐剤30mg	ドンペリドン	院内院外採用
ナウゼリン坐剤60mg	ドンペリドン	院内院外採用
ナジフロキサシロン1%「トワ」 20mL (アキアム後発)	ナジフロキサシン	院内院外採用
ナゼアOD錠0.1mg	塩酸ラモセトロン	院外採用
ナディック錠30mg	ナドロール	院外採用
ナトリックス錠1mg	インダパミド	院内院外採用
ナパゲルンローション3% 50mL	フェルピナク	院外採用
ナフトピジルOD錠75mg「サカイ」(アリクス後発)	ナフトピジル	院内院外採用
ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外採用
ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外採用
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5ug「アソ」(レミッチ後発)	ナルフラフィン塩酸塩	院内院外採用
ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外採用
ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	院内院外採用
ニコチネルTTS10	ニコチン	院外採用
ニコチネルTTS20	ニコチン	院外採用
ニコチネルTTS30	ニコチン	院外採用
ニコランジル錠5mg「サカイ」(シグマ錠後発)	ニコランジル	院内院外採用
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」(サミン後発)	ニセルゴリン	院内院外採用
ニゾラールクリーム2% 10g	ケトコナゾール	院内院外採用
ニゾラールローション2% 10g	ケトコナゾール	院外採用
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	院内院外採用
ニトロダームTTS 25mg	ニトログリセリン	院内院外採用
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	院内院外採用

ニバジール錠 2 mg	ニルバジピン	院外採用
ニフェジピンCR錠20mg「トワ」(アダラートCR後発)	ニフェジピン	院内院外採用
ニフェジピンCR錠40mg「トワ」(アダラートCR後発)	ニフェジピン	院外採用
ニフラン点眼液0.1% 5 mL	プラノプロフェン	院内院外採用
ニュープロパッチ 13.5mg	ロチゴチン	院外採用
ニュープロパッチ 2.25mg	ロチゴチン	院外採用
ニュープロパッチ 4.5mg	ロチゴチン	院外採用
ニュープロパッチ 9mg	ロチゴチン	院内院外採用
ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外採用
ニューレプチル錠 2.5 mg	プロペリシアジアジン	院外採用
ニューレプチル錠 5 mg	プロペリシアジアジン	院外採用
ネイリンカプセル100mg	ホスファトコゲールL-リシンイタノール付加物	院外採用
ネオラル内用液10% 50mL	シクロスポリン	院内院外採用
ネオキシテープ73.5mg (7枚/袋)	オキシブチニン	院外採用
ネオシネジン点眼液 5% 10 mL	塩酸フェニレフリン	院内院外採用
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院内院外採用
ネキシウム懸濁用顆粒分包 20 mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	院外採用
ネシーナ錠12.5mg	安息香酸アログリブチン	院外採用
ネシーナ錠25mg	安息香酸アログリブチン	院外採用
ネバナック懸濁性点眼液0.1%5mL	ネバフェナク	院内院外採用
ネリザ坐剤(ネリザ)後発)	ジフルコロン吉草酸エステル・リトナビル	院外採用
ネリゾナクリーム0.1% 10 g	吉草酸ジフルコロン	院外採用
ネリゾナエムulsion-0.1% 10g	吉草酸ジフルコロン	院内院外採用
ネリゾナ軟膏0.1% 10 g	吉草酸ジフルコロン	院外採用
ノイキノン錠 10 mg	ユビデカレノン	院内院外採用
ノイロトロピン錠 4 単位	ワクチンウイルス接種家兔炎症皮膚抽出	院内院外採用
ノイロピタン配合錠	チトファミン、ビタミンB2,B6,B12	院外採用
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	院外採用
ノービア錠 100 mg	リトナビル	院内院外採用
ノクサフィル錠100mg	ポサコナゾール	院内院外採用
ノバミン錠 5 mg	プロクロルペラジン	院内院外採用
ノフロ点眼液0.3% 5 mL	ノルフロキサシン	院外採用
ノベルジン顆粒5%(50mg/g)	酢酸亜鉛水和物	院外採用
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト、リスプロ	院外採用
ノボラピッド50ミックス注フレックスペン	インスリンアスパルト	院外採用
ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリンアスパルト	院外採用
ノボラピッド注ペンフィル	インスリンアスパルト (遺伝子組	院外採用
ノボリン30R注フレックスペン	ヒトインスリン (遺伝子組換え)	院外採用
ノボリンN注フレックスペン	ヒトインスリン (遺伝子組換え)	院外採用
ノボリンR注フレックスペン	ラタモキシフェナトリウム	院内院外採用
ノルスパンテープ 10 mg	ブプレノルフィン	院外採用
ノルスパンテープ 5 mg	ブプレノルフィン	院外採用
ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	ソマトロピン	院外採用
ノルディトロピン フレックスプロ注15mg	ソマトロピン	院外採用
ノルバデックス錠 20 mg	クエン酸タモキシフェン	院外採用
ハーフジゴキシン K Y錠0.125mg	ジゴキシン	院内院外採用
パーロデル錠2.5mg	メシル酸プロモクリプチン	院外採用
バイアグラ錠25mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外採用
バイアグラ錠50mg	シルデナフィルクエン酸塩	院外採用
バイアスピリン錠 100 mg	アスピリン	院内院外採用
ハイドレアカプセル 500 mg	ヒドロキシカルバミド	院内院外採用
ハイパジール点眼液0.25% 5mL	ニブラジロール	院外採用

ハイペン錠200mg	エトドラク	院外採用
ハイボン錠20mg	酪酸リボフラビン	院外採用
パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン	院内院外採用
バクスマー一点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	院内院外採用
バクタミニ配合錠(バクタ1/4量)	スルファメキサゾール・トリメプ リム	院内院外採用
バクタ配合錠	スルファメキサゾール, トリメプ リム	院外採用
バクタ配合顆粒	スルファメキサゾール, トリメプ リム	院内院外採用
パスタロンソフト軟膏10% 20g	尿素	院内院外採用
バンメット錠0.5mg	塩酸テラゾシン	院外採用
ハッカ油20mL/本	ハッカ油	院内院外採用
パナルジン錠100mg	塩酸チクロピジン	院外採用
バフセオ錠150mg	バダデュスタット	院外採用
バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外採用
バラシクロビル錠500mg「ワイ」(パルトックス後発)	バラシクロビル塩酸塩	院内院外採用
パラミチンカプセル300mg	ブコローム	院外採用
バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル	院内院外採用
バルサルタン錠80mg「オーハラ」(テイホ後発)	バルサルタン	院内院外採用
パルミコート200μgタービュレー56吸入	ブデソニド	院内院外採用
パルミコート吸入液0.5mg/2mL	ブデソニド	院内院外採用
パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	院外採用
パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外採用
パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院内院外採用
ハルロピテープ24mg	ロビニロール塩酸塩	院外採用
ハルロピテープ32mg	ロビニロール塩酸塩	院外採用
ハルロピテープ8mg	ロビニロール塩酸塩	院外採用
ハロペリドール錠1mg「アル」(セルネス後発)	ハロペリドール	院内院外採用
パンクレアチン	パンクレアチン	院内院外採用
パンテチン散20%「NIG」(パントシン後発)	パンテチン	院内院外採用
パントシン錠30mg	パンテチン	院外採用
パンピタン末	総合ビタミン	院内院外採用
ピ・シフロール錠0.5mg	塩酸プラミペキソール水和物	院外採用
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」(旧プロビスク)	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外採用
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」5mL(ヒアレイ後発)	ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外採用
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院外採用
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院外採用
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	院内院外採用
ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジン	院外採用
ピートル顆粒分包250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院内院外採用
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」(アクト後発)	ピオグリタゾン塩酸塩	院内院外採用
ピオフィェルミンR散(エンテロR後発)	耐性乳酸菌製剤	院内院外採用
ピオフィェルミン散剤1g	ビフィズス菌	院外採用
ピオフィェルミン錠剤(ラックレ-後発)	ビフィズス菌製剤	院内院外採用
ピオフィェルミン配合散	ラクトミン製剤	院外採用
ピカルタミドOD錠80mg「NK」(カデックス後発)	ピカルタミド	院内院外採用
ピクシリンS配合錠	アンピシリン, クロキサシリン	院外採用
ピクタルピ配合錠	ピクテグ ラピル・エムトリシトリン・テノホビルアテ	院内院外採用
ピクトーザ皮下注18mg/3mL	リラグルチド	院外採用
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」10mL(ラキソール後発)	ピコスルファートナトリウム	院内院外採用
ヒスロンH錠200mg	酢酸メドロキシプロゲステロン	院内院外採用
ヒスロン錠5mg	酢酸メドロキシプロゲステロン	院外採用
ピソノテープ2mg	ピソプロロール	院内院外採用
ピソノテープ4mg	ピソプロロール	院内院外採用

ピソノテープ 8 mg	ピソプロロール	院外採用
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トワ」(メインテート後発)	ピソプロロールフマル酸塩	院内院外採用
ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トワ」(メインテート後発)	ピソプロロールフマル酸塩	院内院外採用
ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トワ」(メインテート後発)	ピソプロロールフマル酸塩	院内院外採用
ピタスタチンOD錠2mg「KOG」(リパロ後発)	ピタスタチンカルシウム	院内院外採用
ピタメジン配合カプセルB25	B1, B6, B12混合	院外採用
ピダラビン軟膏3%「トワ」5 g(アセチンA後発)	ピダラビン	院内院外採用
ヒダントールF配合錠	フェニトイン, 安カ, フェバルピタル	院外採用
ヒダントール錠25mg	フェニトイン	院内院外採用
ピドキサール錠10mg	リン酸ピリドキサル	院内院外採用
ピドロキシクロキソ硫酸塩錠200mg「DSEP」(アラカル後発)	ピドロキシクロキソ硫酸塩	院内院外採用
ピドロクロロチアジド錠12.5mg「トワ」	ピドロクロロチアジド	院内院外採用
ピプラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	院内院外採用
ピプレッソ徐放錠150mg	クエチアピソフマル酸塩	院外採用
ピプレッソ徐放錠50mg	クエチアピソフマル酸塩	院内院外採用
ピベスピエロアスファ 120吸入	グリコピロム・ホルテロール	院外採用
ピベリデン塩酸塩錠1mg「アム」(アキソト後発)	ピベリデン塩酸塩	院内院外採用
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」5g	ピマリシン	院内院外採用
ピムパットドライシロップ10%	ラコサミド	院内院外採用
ピムパット錠50mg	ラコサミド	院内院外採用
ピモベンダン錠1.25mg「TE」(アラカル後発)	ピモベンダン	院内院外採用
ヒューマリンN注100単位/mL	イソフェンインスリン水性懸濁	院外採用
ヒューマリンR注100単位/mL	ヒトインスリン	院内院外採用
ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換)	院外採用
ヒューマログミックス50注カート300U	インスリンリスプロ(遺伝子組換)	院外採用
ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換)	院外採用
ヒューマログ注カート300U	インスリンリスプロ(遺伝子組換)	院外採用
ヒューマログ注ミリオペン	インスリンリスプロ(遺伝子組換)	院外採用
ピラノアOD錠20mg	ピラスチン	院内院外採用
ピルシカイニド塩酸塩錠25mg「DSEP」(サリスム後発)	ピルシカイニド塩酸塩	院内院外採用
ピルシカイニド塩酸塩錠50mg「DSEP」(サリスム後発)	ピルシカイニド塩酸塩	院内院外採用
ビルダグリプチン錠50mg「トワ」(エクア後発)	ビルダグリプチン	院内院外採用
ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソルピテクスカルシウ	院内院外採用
ヒルドイドクリーム0.3%25g	ヘパリン類似物質	院外採用
ヒルドイドソフト軟膏0.3%25g	ヘパリンナトリウム	院外採用
ヒルドイドローション0.3%150gポン付ボトル	ヘパリン類似物質	院外採用
ヒルドイドローション0.3%25g	ヘパリンナトリウム	院内院外採用
ヒルドイドローション0.3%50g	ヘパリン類似物質	院外採用
ヒルナミン細粒100mg/g	レボメプロマジン	院内院外採用
ヒルナミン錠25mg	レボメプロマジン	院内院外採用
ヒルナミン錠5mg	レボメプロマジン	院内院外採用
ピレーズトリエロアスファ 120吸入	グリコピロム・ホルテロール	院内院外採用
ピレチア細粒10%(100mg/g)	塩酸プロメタジン	院外採用
ピレチア錠25mg	塩酸プロメタジン	院内院外採用
ピレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL(旧カリニ)	ピレノキシ	院内院外採用
ピンマックカプセル61mg	タファミジス	院外採用
ファセンラ皮下注30mgペン	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	院内院外採用
ファミル錠250mg	ファミシクロビル	院外採用
ファミジンD錠20mg「EMEC」(ガスターD20mg後発)	ファミモチジン	院内院外採用
ファミジン散100mg/g「ワイ」(ガスター散後発)	ファミモチジン	院内院外採用
ファロム錠200mg	ファロベネムナトリウム	院外採用
ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	院内院外採用

フィアスプ注 フレックスタッチ	イソリシアスバルト(遺伝子組換え)	院内院外採用
フィアスプ注 ペンフィル	イソリシアスバルト(遺伝子組換え)	院外採用
フィアスプ注100単位/mL 10mL	イソリシアスバルト(遺伝子組換え)	院外採用
フィコンパ細粒1% 10mg/g	ペランパネル水和物	院内院外採用
フィコンパ錠 2 mg	ペランパネル水和物	院内院外採用
ピタマーククリーム 1% 15g/本		院外採用
フィブラストスプレー 5 0 0 ug	トラフェルミン	院内院外採用
フェアストン錠 4 0 mg	クエン酸トレミフェン	院外採用
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」(アレグ 後発)	フェキソフェナジン塩酸塩	院内院外採用
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」(アレグ 後発)	フェキソフェナジン塩酸塩	院内院外採用
フェノバル散 1 0 % (100mg/g)	フェノバルビタール	院内院外採用
フェノバル錠 3 0 mg	フェノバルビタール	院外採用
フェノフィラート錠53.3mg「武田ファ」(リビデイル後発)	フェノフィラート	院内院外採用
フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(フェブ 後発)	フェブキソスタット	院内院外採用
フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(フェブ 後発)	フェブキソスタット	院内院外採用
フェルビナク軟膏3%「三笠」40g(旧スミルチック)	フェルビナク	院内院外採用
フェロ・グラデュメット錠105mg	硫酸鉄	院外採用
フェロミア錠 5 0 mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外採用
フェントステープ 0. 5 mg	フェンタニルクエン酸塩	院内院外採用
フェントステープ1mg	クエン酸フェンタニル	院内院外採用
フェントステープ2mg	クエン酸フェンタニル	院内院外採用
フェントステープ 4 mg	フェンタニルクエン酸塩	院外採用
フェントステープ 6 mg	クエン酸フェンタニル	院内院外採用
フェントステープ 8 mg	フェンタニルクエン酸塩	院外採用
フォシーガ錠 5 mg	ダバグリフロジン	院内院外採用
フォシーガ錠 1 0 mg	ダバグリフロジンプロピレングリ	院内院外採用
フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	院外採用
フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	院外採用
フォリアミン錠 5 mg	葉酸	院内院外採用
プロラム口腔用液 5 mg 1 mL	ミダゾラム	院外採用
フシジンレオ軟膏2% 1 0 g	フシジン酸ナトリウム	院内院外採用
ブシ末(調剤用)「ツムラ」	修治ブシ末	院外採用
ブスコパン錠 1 0 mg	臭化ブチルスコポラミン	院内院外採用
フスタゾール糖衣錠10mg	クロペラスチン	院外採用
ブセレリン点鼻液0.15%「F」(スプレキア後発)	ブセレリン酢酸塩	院内院外採用
ブドウ糖「フソー」	ブドウ糖	院内院外採用
プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	院外採用
プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラート	院外採用
プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラート	院外採用
フラジール内服錠 2 5 0 mg	メトロニダゾール	院内院外採用
フラジール錠 2 5 0 mg	メトロニダゾール	院内院外採用
ブラダロン錠 2 0 0 mg	塩酸フラボキサート	院外採用
プラノバル配合錠	ノルゲストレルエチニルエストラ	院内院外採用
プラバスタチンNa錠10mg「Me」(メバロチン後発)	プラバスタチンナトリウム	院内院外採用
フランドルテープ 4 0 mg/枚	硝酸イソソルビド	院内院外採用
プランルカストDS 10%「日医工」(オノン後発)	プランルカスト水和物	院内院外採用
フリーハンズHMEフロー(8221)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
フリーハンズHMEモイスト(8220)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
ブリエピアクト錠 2 5 mg	ブリーバラセタム	院外採用
プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン	院外採用
プリモニジン点眼液0.1%「SEC」5mL(アイファク 後発)	プリモニジン	院内院外採用
プリモラン錠 5 mg	酢酸メテノロン	院外採用

ブリンゾラミド 懸濁性点眼液1%「サト」5mL(エイブト後発)	ブリンゾラミド	院内院外採用
プリンペラン細粒2%(20mg/g)	メトクロプラミド	院内院外採用
プリンペラン錠5mg	メトクロプラミド	院内院外採用
フルコナゾールカプセル100mg「サト」(ジフルカン100mg後発)	フルコナゾール	院内院外採用
フルコナゾールカプセル50mg「サト」(ジフルカン50mg後発)	フルコナゾール	院内院外採用
フルスタン錠0.3ug	ファレカルシトリオール	院外採用
フルスルチアミン錠25mg「トワ」(アリミンF後発)	フルスルチアミン	院内院外採用
フルタイド2000ディスクス	プロピオン酸フルチカゾン	院外採用
フルチカゾン点鼻液27.5μg「武田チカ」56噴霧(アミスト後発)	フルチカゾンフランカルボン酸	院内院外採用
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾン/ホルモテロール	院内院外採用
フルニトラゼパム錠1mg「アム」(サイレース後発)	フルニトラゼパム	院内院外採用
ブルフェン錠100mg	イブプロフェン	院外採用
ブルフェン錠200mg	イブプロフェン	院外採用
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アム」(デプロメル後発)	フルボキサミンマレイン酸塩	院内院外採用
フルメタクリーム10g	フランカルボン酸モメタゾン	院外採用
フルメタローション10g	フランカルボン酸モメタゾン	院外採用
フルメタ軟膏10g	フランカルボン酸モメタゾン	院内院外採用
フルメトロン0.02%5mL	フルオロメトロン	院内院外採用
フルメトロン0.1%5mL	フルオロメトロン	院内院外採用
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」(リカ後発)	プレガバリン	院内院外採用
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」(リカ後発)	プレガバリン	院内院外採用
フレキシダーム円形(7253)(20枚入)	整形外科用テープ	院外採用
フレキシダーム楕円形(7254)(20枚入)	整形外科用テープ	院外採用
フレキシダーム楕円形(7254JP)(15枚入)	整形外科用テープ	院外採用
ブレディニンOD錠50	ミゾリピン	院内院外採用
プレドニゾロン散「タケダ」1%10mg/g	プレドニゾロン	院内院外採用
プレドニゾロン錠1mg	プレドニゾロン	院内院外採用
プレドニゾロン錠2.5mg「NP」	プレドニゾロン	院内院外採用
プレドニゾロン錠5mg	プレドニゾロン	院内院外採用
プレバイミス錠240mg	レテルモビル	院内院外採用
プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン	院外採用
ブークスライフアドヒージブ強化型シール(8263)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフアドヒージブナイト用シール(8261)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフアドヒージブ敏感肌用シール円形(7463)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフアドヒージブ敏感肌用シール楕円型(7464)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフアドヒージブ敏感肌用シール大型(7466)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフアドヒージブ普通肌用シール円形(7460)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフアドヒージブ普通肌用シール楕円型(7461)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフアドヒージブ普通肌用シール大型(7462)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフエナジ-HME(人工鼻)(8312)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフゴ-HME(人工鼻)(8310)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフナイトHME(人工鼻)(8262)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフフリーハズ用HME(人工鼻)(7440)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフホームHME(人工鼻)(8311)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフリチューブリング付開窓型10/36(8052)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフリチューブリング付開窓型10/55(8053)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフリチューブリング付開窓型12/36(8054)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフリチューブリング付開窓型12/55(8055)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフリチューブリング付開窓型8/36(8048)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフリチューブリング付開窓型8/55(8049)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフリチューブリング付開窓型9/36(8050)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブークスライフリチューブリング付開窓型9/55(8051)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用

ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` リング` 付標準型 10/36 (7425)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` リング` 付標準型 10/55 (7426)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` リング` 付標準型 12/36 (7427)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` リング` 付標準型 12/55 (7428)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` リング` 付標準型 8/36 (7421)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` リング` 付標準型 8/55 (7422)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` リング` 付標準型 9/36 (7423)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` リング` 付標準型 9/55 (7424)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 10/27 (7415)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 10/36 (7416)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 10/55 (7417)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 12/27 (7418)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 12/36 (7419)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 12/55 (7420)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 8/27 (7409)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 8/36 (7410)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 8/55 (7411)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 9/27 (7412)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 9/36 (7413)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型 9/55 (7414)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型開窓型 10/36 (7433)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型開窓型 10/55 (7434)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型開窓型 12/36 (7435)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型開窓型 12/55 (7436)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型開窓型 8/36 (7429)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型開窓型 8/55 (7430)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型開窓型 9/36 (7431)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リチーフ` 標準型開窓型 9/55 (7432)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リホ` タン 12/18 (8041)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リホ` タン 12/8 (8040)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リホ` タン 14/18 (8043)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リホ` タン 14/8 (8042)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リホ` タン 16/18 (8045)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リホ` タン 16/8 (8044)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リホ` タン 18/18 (8047)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ リホ` タン 18/8 (8046)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ブ`ロウ`ホックスライフ 細菌・ウイルスフィルター付 HME 人工鼻 (8313)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
プログラフカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	院内院外採用
プログラフカプセル 1mg	タクロリムス水和物	院内院外採用
プログラフ顆粒 0.2mg/包	タクロリムス水和物	院内院外採用
プロサイリン錠 2.0ug	ペラプロストナトリウム	院外採用
フロジン外用液5% 3.0mL	塩化カルプロニウム	院内院外採用
ブ`ロスタク` ランジ` ヌE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	院内院外採用
ブ`ロスタデ` イン軟膏0.003% 1.0g	アルプロスタジルアルファデクス	院内院外採用
プロセキソール錠 0.5mg	エチニルエストラジオール	院外採用
フロセミド細粒 4%「EMEC」40mg/g (ラシックス後発)	フロセミド	院内院外採用
フロセミド錠10mg「NP」 (ラシックス後発)	フロセミド	院内院外採用
フロセミド錠20mg「NP」 (ラシックス後発)	フロセミド	院内院外採用
フロセミド錠40mg「NP」 (ラシックス後発)	フロセミド	院内院外採用
プロチゾラムOD錠0.25mg「カウイ」(レンド`ルミンD錠後発)	プロチゾラム	院内院外採用
プロテカジン錠 1.0mg	ラフチジン	院外採用
プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	タクロリムス	院内院外採用

プロトピック軟膏0.1% 5 g	タクロリムス	院内院外採用
プロナック点眼液0.1% 5 mL	ブロムフェナクナトリウム	院外採用
プロナンセリン錠4mg「DSPB」(ロゼン後発)	プロナンセリン	院内院外採用
プロピペリン塩酸塩錠10mg 「杏林」 (ハップフォ-後発)	プロピペリン塩酸塩	院内院外採用
プロベシア錠0.2mg	フィナステリド	院外採用
プロマックD錠7.5	ポラプレジンク	院外採用
プロマック顆粒1.5% 0.5 g 包	ポラプレジンク	院外採用
ブロムヘキシンシロップ 0.08% 「ト-7」 0.8mg/mL(ヒソボ-ン後発)	ブロムヘキシン塩酸塩	院内院外採用
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 「タロ-」 (ヒソボ-ン後発)	ブロムヘキシン塩酸塩	院内院外採用
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg 「サ7」 (ヒソボ-ン後発)	ブロムヘキシン塩酸塩	院内院外採用
フロリードDクリーム1% 10 g	硝酸ミコナゾール	院外採用
フロリードゲル経口用2% 5 g	ミコナゾール	院内院外採用
フロリネフ錠0.1 mg	酢酸フルドロコルチゾン	院外採用
ページニオ錠100mg	アベマシクリブ	院外採用
ページニオ錠150mg	アベマシクリブ	院外採用
ページニオ錠50mg	アベマシクリブ	院外採用
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	院内院外採用
ベクロメタゾン鼻用スプレー-25µg「ト-7」(リノコト後発)	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外採用
ベサコリン散5%(50mg/g)	塩化ベタネコール	院内院外採用
ベザトールSR錠100mg	ベザフィブラート	院外採用
ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート	院外採用
ベサノイドカプセル100mg	トレチノイン	院外採用
ベザフィブラートSR錠200mg 「サ7」 (ベザトール後発)	ベザフィブラート	院外採用
ベストロン耳鼻科用1% 5 mL	塩酸セフメノキシム	院外採用
ベストロン点眼用0.5% 5 mL	塩酸セフメノキシム	院内院外採用
ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外採用
ベタナミン錠10mg	ペモリン	院外採用
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	院外採用
ベトキシメチル硫酸塩錠6mg「日医工P」(メスロン後発)	ベトキシメチル硫酸塩	院内院外採用
ベトメタゾン・PF眼耳鼻科用液0.1% 「日点」 (旧リノベ-タ)	ベトメタゾン酢酸エステルナトリウム	院外採用
ベナンボックス注用300mg	イセチオン酸ペンタミジン	院内院外採用
ベニジピン塩酸塩錠4mg 「サ7」 (ニール後発)	ベニジピン塩酸塩	院内院外採用
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位シリンジ 「モダ」	ヘパリンカルシウム	院内院外採用
ヘパリン類似物質泡状スプレー0.3% 「ニットー」 100g	ヘパリン類似物質	院内院外採用
ヘパリン類似物質泡状スプレー0.3% 「ニットー」 200g	ヘパリン類似物質	院外採用
ヘパリン類似物質泡状スプレー0.3% 「日本臓器」 200g	ヘパリン類似物質	院外採用
ヘパリン類似物質油性クリーム「ニトロ」 25g (ヒルデイドソフト後発)	ヘパリン類似物質	院内院外採用
ベピオゲル2.5% 15g	過酸化ベンゾイル	院外採用
ベプシドカプセル25mg	エトポシド	院外採用
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 (ベプリコール後発)	ベプリジル塩酸塩水和物	院内院外採用
ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タベ」 (タベタ後発)	ベボタスチンベシル酸塩	院内院外採用
ベムリディ錠25mg	テノホビルアラフェナミド fumarate	院内院外採用
ヘモポリゾン軟膏 2g(強力ホステリオン軟膏後発)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	院内院外採用
ベラバミル塩酸塩錠40mg 「JG」 (ワソラン後発)	ベラバミル塩酸塩	院内院外採用
ベラプロストNa錠20µg 「オハラ」 (トルタ後発)	ベラプロストナトリウム	院外採用
ベリアクチン散10mg/g	塩酸シプロヘプタジン	院外採用
ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	院内院外採用
ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	院外採用
ベリチーム配合顆粒	濃厚膵臓性消化酵素,細菌性脂肪	院内院外採用
ペリンドプリルエルブミン錠2mg 「ト-7」 (コバシ後発)	ペリンドプリルエルブミン	院内院外採用
ペリンドプリルエルブミン錠4mg 「ト-7」 (コバシ後発)	ペリンドプリルエルブミン	院内院外採用
ベルジピンL Aカプセル40mg	塩酸ニカルジピン	院外採用

ベルソムラ錠 10mg	スポレキサント	院内院外採用
ベルソムラ錠 15mg	スポレキサント	院内院外採用
ベルソムラ錠 20mg	スポレキサント	院内院外採用
ヘルベッサ-Rカプセル 100mg	塩酸ジルチアゼム	院内院外採用
ヘルベッサ錠 30mg	塩酸ジルチアゼム	院外採用
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アム」(ル-ラン後発)	ペロスピロン塩酸塩水和物	院内院外採用
ベンザリン細粒1%(10mg/g)	ニトラゼパム	院外採用
ベンザリン錠 5mg	ニトラゼパム	院内院外採用
ベンズプロマロン錠50mg「NIG」(クリノ-ム後発)	ベンズプロマロン	院外採用
ペントサ坐剤 1g	メサラジン	院外採用
ペントサ錠250mg	メサラジン	院外採用
ペントサ錠500mg	メサラジン	院内院外採用
ペントサ注腸 1g 100mL	メサラジン	院外採用
ペントサ顆粒94%	メサラジン	院外採用
ホクナリンテープ0.5mg	塩酸ツロブテロール	院外採用
ホクナリンテープ 1mg	塩酸ツロブテロール	院外採用
ホクナリンテープ 2mg	塩酸ツロブテロール	院内院外採用
ボグリボースOD錠0.2mg「武田薬」(ベ-イズ後発)	ボグリボース	院内院外採用
ボグリボースOD錠0.3mg「武田薬」(ベ-イズ後発)	ボグリボース	院内院外採用
ポステリザン軟膏強力 2g	大腸菌死菌浮遊液, ヒトコロチン	院外採用
ホスミシンDS 400mg/g	ホスホマイシンナトリウム	院外採用
ホスミシン錠 500mg	ホスホマイシンカルシウム	院内院外採用
ホスリボン配合顆粒 (100mg/包)	リン酸二水素Na, リン酸水素二Na	院内院外採用
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院内院外採用
ポビドンヨードゲル10%「ケン-」 90g(イソジノゲル後発)	ポビドンヨード	院内院外採用
ポビドンヨード 消毒液10%「ケン-」 250mL(旧イタイン)	ポビドンヨード	院内院外採用
ポラキス錠 3mg	塩酸オキシブチニン	院外採用
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」(プロマック後発)	ポラプレジンク	院内院外採用
ポララミンシロップ 0.04% (0.4mg/mL)	d-マレイン酸クロルフェニラミ	院外採用
ポララミン錠 2mg	d-マレイン酸クロルフェニラミ	院内院外採用
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 0.6g/包(コドコ後発)	ポリカルボフィルカルシウム	院内院外採用
ポリコナゾール錠200mg「トワ」(ブイェント後発)	ポリコナゾール	院内院外採用
ホリゾン散 10mg/g	ジアゼパム	院内院外採用
ポリフル錠 500mg	ポリカルボフィルカルシウム	院外採用
ポリキシリンB硫酸塩錠100万単位「ファイザ-」	硫酸ポリキシリンB	院内院外採用
ポルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外採用
ポルタレンサポ 12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外採用
ポルタレンサポ 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外採用
ポルタレンサポ 50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外採用
ポナルファハイロ-ション 20μg/g	タカルシトール	院外採用
ポナルファハイ軟膏 10g	タカルシトール	院外採用
ポントールカプセル 250mg	メフェナム酸	院外採用
ボンピバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	院外採用
マーズレンS配合顆粒	アズレンスリン酸ナトリウム, L-グルタミン	院内院外採用
マーデュオックス軟膏 10g	メチルサリチル酸/ベンゾカロン酪酸エステル	院外採用
マイクロンHME(7247)(5個/箱)	人工鼻	院外採用
マイクロンHME(7248)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
マイコスポールクリーム 1% 10g	ビフォナゾール	院外採用
マイザークリーム0.05% 10g	ジフルプレドナート	院内院外採用
マイザー軟膏0.05% 10g	ジフルプレドナート	院外採用
マイスタン細粒 10mg/g	クロバザム	院内院外採用
マイスタン錠 5mg	クロバザム	院外採用

マイテラーゼ錠10mg	塩化アンペノニウム	院外採用
マクロゴール軟膏	マクロゴール	院内院外採用
マスーレッド錠25mg	モリデュスタットナトリウム	院外採用
マスクンRエタノール液0.5%	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外採用
マスクンWエタノール液0.5%	グルコン酸クロルヘキシジン	院内院外採用
マリゼブ錠12.5mg	オマリグリプチン	院外採用
マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン	院外採用
マンジャロ皮下注10mgアテス	チルゼパチド	院外採用
マンジャロ皮下注12.5mgアテス	チルゼパチド	院外採用
マンジャロ皮下注15mgアテス	チルゼパチド	院外採用
マンジャロ皮下注2.5mgアテス	チルゼパチド	院内院外採用
マンジャロ皮下注5mgアテス	チルゼパチド	院内院外採用
マンジャロ皮下注7.5mgアテス	チルゼパチド	院外採用
ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	院内院外採用
ミカト配合錠(テルミカルタン80mg・アムロジピン5mg・HCTZ12.5mg)	テルミカルタン・アムロジピン・ヒドクロロチアジド	院外採用
ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩	院外採用
ミグリトール錠50mg「トーフ」(セイブル後発)	ミグリトール	院内院外採用
ミケランL A点眼液2% 2.5mL	塩酸カルテオロール	院外採用
ミケラン点眼液2% 5mL	塩酸カルテオロール	院外採用
ミケルナ配合点眼液2.5mL/本	カルテオロール塩酸塩・タガボロスト	院内院外採用
ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」(グルファスト後発)	ミチグリニドカルシウム水和物	院内院外採用
ミドリン塩酸塩錠2mg「JG」(メリゾン後発)	ミドリン塩酸塩	院内院外採用
ミドリンM点眼液0.4% 5mL	トロピカミド	院内院外採用
ミドリンP点眼液5mL	トロピカミド,塩酸フェニレフリ	院内院外採用
ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン酢酸塩	院外採用
ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレノン	院内院外採用
ミネプロOD錠5mg	エサキセレノン	院外採用
ミノマイシンカプセル100mg	塩酸ミノサイクリン	院内院外採用
ミノマイシンカプセル50mg	塩酸ミノサイクリン	院外採用
ミノマイシン顆粒2%(20mg/g)	塩酸ミノサイクリン	院内院外採用
ミヤBM細粒	宮入菌	院内院外採用
ミヤBM錠(20mg)	宮入菌	院内院外採用
ミラベックスLA錠0.375mg	プラミペキソール	院外採用
ミラベックスLA錠1.5mg	塩酸プラミペキソール	院外採用
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」(リフレックス後発)	ミルタザピン	院内院外採用
ミルラクト細粒50%(500mg/g)	チラクターゼ	院内院外採用
ミンクリア内用散布液0.8% 20mL	トメントール	院内院外採用
ムコサールドライシロップ1.5%(15mg/g)	塩酸アンブロキシソール	院外採用
ムコスタ錠100mg	レバミピド	院外採用
ムコスタ点眼液UD2%0.35mL	レバミピド	院外採用
ムコダインDS50%(500mg/1g)	カルボシステインシロップ	院外採用
ムコダイン錠250mg	カルボシステイン	院外採用
ムコダイン錠500mg	カルボシステイン	院外採用
メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	院外採用
メインテート錠0.625mg	フマル酸ビスプロロール	院外採用
メキシチールカプセル100mg	塩酸メキシレチン	院外採用
メキシチールカプセル50mg	塩酸メキシレチン	院外採用
メキシチール塩酸塩カプセル50mg「サワイ」(メキシチール後発)	メキシレチン塩酸塩	院内院外採用
メサデルムクリーム0.1% 10g	プロピオン酸デキサメタゾン	院外採用
メサデルム軟膏0.1% 10g	プロピオン酸デキサメタゾン	院外採用
メスチノン錠60mg	臭化ピリドスチグミン	院内院外採用
メソトレキセート錠2.5mg	メソトレキセート	院内院外採用

メタルカプターゼカプセル100mg	D-ペニシラミン	院外採用
メチコパール錠500ug	メコバラミン	院内院外採用
メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸	院内院外採用
メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」(テラビッド後発)	メチルジゴキシン	院内院外採用
メトグルコ錠250mg	塩酸メトホルミン	院内院外採用
メトグルコ錠500mg	メトホルミン塩酸塩	院外採用
メトトレキサート錠1mg「日本臓器」(リウマトレックス後発)	メトトレキサート	院外採用
メトトレキサート錠2mg「日本臓器」(リウマトレックス後発)	メトトレキサート	院外採用
メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン	院内院外採用
メバロチン錠5mg	プラバスタチンナトリウム	院外採用
メプチンエア-10μg吸入100回	塩酸プロカテロール	院内院外採用
メプチン吸入液0.01%30mL/本	塩酸プロカテロール	院外採用
メプチン吸入液ユニット0.3mL	塩酸プロカテロール	院内院外採用
マンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(マリ-後発)	メマンチン塩酸塩	院内院外採用
マンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(マリ-後発)	メマンチン塩酸塩	院内院外採用
メラトベル錠小児用1mg	メラトニン	院外採用
メラトベル顆粒小児用0.2%2mg/g	メラトニン	院内院外採用
メリスロン錠6mg	メシル酸ベタヒスチン	院外採用
メルカゾール錠2.5mg	チアマゾール	院外採用
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	院内院外採用
メンタックスクリーム1%10g	塩酸ブテナフィン	院外採用
モイゼルト軟膏1%10g	ジフェニラスト軟膏	院外採用
モービック錠10mg	メロキシカム	院外採用
モーラスパップ30mg7枚/包	ケトプロフェン	院外採用
モーラスパップXR240mg7枚/包	ケトプロフェン	院外採用
モキシロキサシン点眼液0.5%「サト」5mL(ベガモックス後発)	モキシフロキサシン塩酸塩	院内院外採用
モブライドケン酸塩散10mg/g「日医工」(カステフ後発)	モブライドケン酸塩水和物	院内院外採用
モサブライドケン酸塩錠5mg「AA」(カステフ後発)	モサブライドケン酸塩水和物	院内院外採用
モニラックシロップ6.5%	ラクツロース	院外採用
モビコール配合内用剤HD	マクロール4000,NaCl,NaHCO3,KCl	院外採用
モビコール配合内用剤LD	マクロール4000,NaCl,NaHCO3,KCl	院内院外採用
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用(ナゾネックス後発)	モメタゾンフランカルボン酸エス	院内院外採用
モンテルカストチアール錠5mg「タタ」(キプレス/シグレア後発)	モンテルカストナトリウム	院内院外採用
モンテルカスト錠10mg「KM」(シグレア/キプレス後発)	モンテルカストナトリウム	院内院外採用
ヤーズフレックス配合錠(28錠/シート)	ドロスピレノ・エチルエストラジオール	院外採用
ヤクバンテープ60mg7枚/袋	フルルビプロフェン	院外採用
ユーエフティE配合顆粒T150	テガフルル,ウラシル配合剤	院外採用
ユーエフティE配合カプセルT100	テガフルル,ウラシル配合剤	院外採用
ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	院外採用
ユナシン細粒小児用10%(100mg/g)	トシル酸スルタミシリン	院内院外採用
ユナシン錠375mg	トシル酸スルタミシリン	院外採用
ユバンシ配合錠(マシテンタン10mg/タダラフィル40mg)	マシテンタン・タダラフィル	院外採用
ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院内院外採用
ユリス錠1mg	ドチヌラド	院外採用
ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外採用
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	院内院外採用
ヨクイニンエキス錠コタロー	ヨクイニンエキス	院外採用
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリンデグリン・インスリンアスパルト	院内院外採用
ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム	院外採用
ラクツロースシロップ65%「タタ」(モニラック後発)	ラクツロース	院内院外採用
ラグノスNF経口ゼリー分包12g(モニラック後発)	ラクツロース	院内院外採用
ラコールNF配合経腸用液200mL	経腸成分栄養剤液	院内院外採用

ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外採用
ラタノプロストPF点眼0.005%「日点」2.5mL（キヲタ後発）	ラタノプロスト	院内院外採用
ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	院内院外採用
ラックビー錠	ビフィズス菌	院外採用
ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤	院外採用
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」（パリエット後発）	ラベプラゾールナトリウム	院内院外採用
ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン	院外採用
ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン	院外採用
ラミシールクリーム1% 10g	塩酸テルピナフィン	院外採用
ラメルテオン錠8mg「サワイ」（ロゼム後発）	ラメルテオン	院内院外採用
ラモトリギン錠100mg「トーワ」（ラミクタール後発）	ラモトリギン	院内院外採用
ラモトリギン錠25mg「トーワ」（ラミクタール後発）	ラモトリギン	院内院外採用
ラリキシン錠250mg（セファレキシンcap代替）	セファレキシン	院内院外採用
ラリチューブBR型10/36(7628)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型10/55(7629)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型12/36(7630)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型12/55(7631)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型8/36(7624)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型8/55(7625)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型9/36(7626)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブBR型9/55(7627)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型10/36(7643)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型10/55(7644)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型12/36(7646)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型12/55(7647)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型8/36(7637)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型8/55(7638)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型9/36(7640)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ開窓型9/55(7641)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型10/27(7609)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型10/36(7610)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型10/55(7611)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型12/27(7613)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型12/36(7614)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型12/55(7615)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型8/27(7601)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型8/36(7602)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型8/55(7603)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型9/27(7605)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型9/36(7606)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリチューブ標準型9/55(7607)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン12/18(7685)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン12/8(7671)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン14/18(7686)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン14/8(7672)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン16/18(7687)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン16/8(7673)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン18/18(7688)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラリボタン18/8(7674)	再使用可能な気管切開チューブ	院外採用
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」（レビスタ後発）	ラロキシフェン塩酸塩水和物	院内院外採用
ランゾプラゾールOD錠15mg「サワイ」（タゾプロンOD後発）	ランゾプラゾール	院内院外採用
ランタスXR注シロスター 450単位/キット	インスリンゲルマキソン（遺伝子組換え）	院内院外採用

ランデル錠 20mg	塩酸エホニジピン	院外採用
リアルダ錠1200mg	メサラジン	院内院外採用
リアルダ錠600mg	メサラジン	院外採用
リーゼ錠 5mg	クロチアゼパム	院外採用
リーバクト配合経口ゼリー 20g	イソロイシン, ロイシン, バリン	院外採用
リーバクト配合顆粒 4.15g/包	イソロイシン, ロイシン, バリン	院内院外採用
リーマス錠 100mg	炭酸リチウム	院外採用
リーマス錠 200mg	炭酸リチウム	院外採用
リウマトレックスカプセル 2mg	メソトレキセート	院内院外採用
リオナ錠 250mg	クエン酸第二鉄水和物	院内院外採用
リオベル配合錠LD(アログリプチン25mg・ピオグリタゾン15mg)	アログリプチン・ピオグリタゾン	院外採用
リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院外採用
リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院内院外採用
リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	院内院外採用
リザトリプタンOD錠10mg「トワ」(マサル後発)	リザトリプタン安息香酸塩	院内院外採用
リザベンカプセル 100mg	トラニラスト	院内院外採用
リザベン細粒 10% (100mg/g)	トラニラスト	院外採用
リザベン点眼液0.5% 5mL	トラニラスト	院外採用
リスバダールOD錠 0.5mg	リスペリドン	院外採用
リスバダールOD錠 1mg	リスペリドン	院外採用
リスペリドンOD錠1mg「アメル」(リスバダール後発)	リスペリドン	院内院外採用
リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」 10mg/g(リスバダール後発)	リスペリドン	院内院外採用
リスペリドン内用液 1mg/mL「トワ」(リスバダール後発)	リスペリドン	院内院外採用
リスマー錠 1mg	塩酸リルマザホン	院内院外採用
リスマダンR錠 150mg	ジソピラミド	院内院外採用
リスマダンカプセル 100mg	ジソピラミド	院外採用
リズモンTG0.5%2.5mL	マレイン酸チモロール	院外採用
リセドロン錠17.5mg「日新」(アクトル後発・骨粗鬆症用)	リセドロン酸ナトリウム水和物	院内院外採用
リドメックスコーワクリーム0.3%10g	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院外採用
リドメックスコーワローション0.3%10g	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院内院外採用
リドメックスコーワ軟膏0.3%10g	吉草酸酢酸プレドニゾロン	院内院外採用
リパクレオンカプセル 150mg	パンクレリパーゼ	院外採用
リパクレオンカプセル 150mg	パンクレリパーゼ	院内院外採用
リバゼブ配合錠HD(ピタバスタチン4mg,エトフィミン10mg)	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外採用
リバゼブ配合錠LD(ピタバスタチン2mg,エトフィミン10mg)	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外採用
リファンピシカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	院内院外採用
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	院内院外採用
リフヌア錠 45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩	院外採用
リベルサス錠 14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外採用
リベルサス錠 3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内院外採用
リベルサス錠 7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院内院外採用
リベスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	塩酸レボカバチン	院外採用
リボトリール細粒0.5%(5mg/g)	クロナゼパム	院内院外採用
リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	院内院外採用
リボトリール錠 1mg	クロナゼパム	院内院外採用
リボトリール錠 2mg	クロナゼパム	院外採用
リマチル錠 100mg	プシラミン	院内院外採用
リマプロストアルファ錠5μg「日医工」(オパルモン後発)	リマプロスト アルファデクス	院内院外採用
リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外採用
リムパーザ錠150mg	オラパリブ	院外採用
リュウアト眼軟膏 1%3.5g	硫酸アトロピン	院内院外採用
リルゾール錠50mg「AA」(リルテック50後発)	リルゾール	院内院外採用

リンヴォック錠15mg	ウバダシチニブ水和物	院外採用
リンヴォック錠30mg	ウバダシチニブ水和物	院外採用
リンヴォック錠45mg	ウバダシチニブ水和物	院内院外採用
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	院内院外採用
リンデロンA液点眼・点鼻用5mL	リン酸ベタメタゾンナトリウム	院内院外採用
リンデロンA軟膏眼耳科用5g	リン酸ベタメタゾンナトリウム	院内院外採用
リンデロンDP軟膏0.064%10g	ジプロピオン酸ベタメタゾン	院外採用
リンデロンVGクリーム10g	吉草酸ベタメタゾン（硫酸ゲンマイ	院内院外採用
リンデロンVGローション10mL	吉草酸ベタメタゾン（硫酸ゲンマイ	院内院外採用
リンデロンVG軟膏10g	吉草酸ベタメタゾン（硫酸ゲンマイ	院内院外採用
リンデロンVクリーム10g	吉草酸ベタメタゾン	院内院外採用
リンデロンV軟膏10g	吉草酸ベタメタゾン	院内院外採用
リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	院外採用
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%5mL	ベタメタゾン	院外採用
リンデロン点眼液0.01%5mL	ベタメタゾン	院外採用
リンラキサー錠125mg	カルバミン酸クロルフェネシン	院外採用
リンラキサー錠250mg	カルバミン酸クロルフェネシン	院外採用
ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	院外採用
ルジオミール錠10mg	塩酸マプロチリン	院外採用
ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン	院外採用
ルセフィ錠5mg	ルセオグリフロジン水和物	院外採用
ルティナス錠100mg	プロゲステロン	院外採用
ルテムム腔用坐剤400mg	プロゲステロン	院内院外採用
ルトラール錠2mg	酢酸クロルマジノン	院外採用
ルナHME(8013)(30個/箱)	人工鼻	院外採用
ルナアドヒーシブ(8014)(15枚入)	整形外科用テープ	院外採用
ルパフィン錠10mg	ルバタジンフマル酸塩	院内院外採用
ルプキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリン	院内院外採用
ルミガン点眼液0.03%2.5mL	ビマトプロスト	院外採用
ルミセフ皮下注210mgシリンジ1.5mL	プロダルマブ	院外採用
ルムジェブ注カート	ｲﾝｽﾘﾝｽｸﾞﾗ(遺伝子組換え)	院外採用
ルムジェブ注100単位/mL10mL	ｲﾝｽﾘﾝｽｸﾞﾗ(遺伝子組換え)	院外採用
ルムジェブ注ミリオペン	ｲﾝｽﾘﾝｽｸﾞﾗ(遺伝子組換え)	院内院外採用
ルリコナゾールクリーム1%「イキ」10g(ルリコン後発)	ルリコナゾール	院内院外採用
ルリコナゾール軟膏1%「イキ」10g(ルリコン後発)	ルリコナゾール	院内院外採用
レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外採用
レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外採用
レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラゾール	院内院外採用
レキサルティOD錠1mg	ブレクスピプラゾール	院内院外採用
レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール	院外採用
レキソタン錠2mg	プロマゼパム	院外採用
レキソタン錠5mg	プロマゼパム	院外採用
レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院内院外採用
レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	院外採用
レザルタス配合錠HD(ホルメサルタン20mg・アゼルニジピン16mg)	ホルメサルタンメドキシミル、アゼルニジピン	院外採用
レザルタス配合錠LD(ホルメサルタン10mg・アゼルニジピン8mg)	ホルメサルタンメドキシミル、アゼルニジピン	院外採用
レスキュラ点眼液0.12%5mL	イソプロピル ウノプロストン	院外採用
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	院内院外採用
レスブレン錠20mg	塩酸エブラジノン	院内院外採用
レトロゾール錠2.5mg「サト」(フェマラ後発)	レトロゾール	院内院外採用
レトロビルカプセル100mg	ジドブジン	院内院外採用
レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	院内院外採用

レバグリニド錠0.5mg「サワイ」(シュボ <sup>®</sup> 後発)	レバグリニド	院外採用
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」5mL(ムコスタ後発)	レバミピド	院内院外採用
レバミピド錠100mg「オーツカ」(ムコスタ後発)	レバミピド	院内院外採用
レバミピド顆粒20%「効効」(200mg/g)(ムコスタ後発)	レバミピド	院内院外採用
レベタン坐剤0.2mg	塩酸ブプレノルフィン	院内院外採用
レベチラセタム錠500mg「トーワ」(イケブ <sup>®</sup> 後発)	レベチラセタム	院内院外採用
レベミル注フレックスペン	インスリンデテムル(遺伝子組換)	院外採用
レボカ <sup>®</sup> スチン点眼液0.025%「TS」(レボ <sup>®</sup> スチン後発)	レボカバステチン	院外採用
レボセチリジン塩酸塩DS5mg/g「効効」(ザイザ <sup>®</sup> 後発)	レボセチリジン塩酸塩	院内院外採用
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「プロ」(ザイザ <sup>®</sup> 後発)	レボセチリジン塩酸塩	院内院外採用
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(ケレビ <sup>®</sup> ット錠250mg後発)	レボフロキサシン水和物	院内院外採用
レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」5mL(ケレビ <sup>®</sup> ット後発)	レボフロキサシン水和物	院内院外採用
レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	院外採用
レボレード錠25mg	エルトロンボパグ オラミン	院外採用
レミニールOD錠12mg	臭化水素酸ガランタミン	院外採用
レミニールOD錠4mg	臭化水素酸ガランタミン	院内院外採用
レミニールOD錠8mg	臭化水素酸ガランタミン	院外採用
レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン	院外採用
レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロール/フルチカゾン	院内院外採用
レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院外採用
レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム	院外採用
レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	院内院外採用
レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	院内院外採用
ロイケリン散10%(100mg/g)	メルカプトプリン	院内院外採用
ロイコポリン錠5mg	ロイコポリンカルシウム	院外採用
ローコール錠30mg	フルバスタチン	院内院外採用
ロキサチジン徐放カプセル75mg「サワイ」(アルタ <sup>®</sup> 後発)	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	院内院外採用
ロキシロマイシン錠150mg「トーワ」(ルリッド <sup>®</sup> 後発)	ロキシシロマイシン	院内院外採用
ロキソニンゲル1%25g	ロキソプロフェンナトリウム	院外採用
ロキソニンテープ100mg7枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム	院外採用
ロキソニンテープ50mg7枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム	院外採用
ロキソニンパップ100mg7枚/袋	ロキソプロフェンナトリウム	院外採用
ロキソニン細粒10%(100mg/g)	ロキソプロフェンナトリウム	院内院外採用
ロキソ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> エンNa <sup>®</sup> テープ100mg「科研」(後発)7枚/袋	ロキソ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> エンナトリウム水和物	院内院外採用
ロキソ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> エンNa <sup>®</sup> テープ50mg「科研」(後発)7枚/袋	ロキソ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> エンナトリウム水和物	院外採用
ロキソ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> エンNa <sup>®</sup> 細粒60mg/包「サワイ」(ロキソ <sup>®</sup> 後発)	ロキソ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> エンナトリウム水和物	院外採用
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」(ロキソ <sup>®</sup> 後発)	ロキソプロフェンナトリウム	院内院外採用
ロケルマ懸濁用散分包10g	ジルニコムシクロイ酸トリウム水和物	院内院外採用
ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルニコムシクロイ酸トリウム水和物	院内院外採用
ロコアテープ7枚/袋	エスフルビ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> エン・ハッカ油	院内院外採用
ロコイドクリーム0.1%10g	酪酸ヒドロコルチゾン	院内院外採用
ロコイド軟膏0.1%10g	酪酸ヒドロコルチゾン	院内院外採用
ロサルタンK錠25mg「明治」(ニュー <sup>®</sup> タン後発)	ロサルタンカリウム	院内院外採用
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」(クレストール後発)	ロスバスタチンカルシウム	院内院外採用
ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」(クレストール後発)	ロスバスタチンカルシウム	院内院外採用
ロゼックスゲル0.75%15g	メトロナダゾールゲル	院内院外採用
ロドピン細粒100mg/g	ゾテピン	院外採用
ロドピン錠25mg	ゾテピン	院内院外採用
ロナセンテープ20mg	プロナンセリン	院内院外採用
ロナセンテープ40mg	プロナンセリン	院内院外採用
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」(メイラックス <sup>®</sup> 後発)	ロフラゼブ酸エチル	院内院外採用
ロプレソールSR錠120mg	酒石酸メトプロロール	院外採用

ロプレソール錠20mg	酒石酸メトプロロール	院内院外採用
ロペミン小児用0.5mg/g	塩酸ロペラミド	院外採用
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サイ」(ロペミン後発)	塩酸ロペラミド	院内院外採用
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」(ロペミン後発)	塩酸ロペラミド	院内院外採用
ロラゼパム錠0.5mg「サイ」(ワイパックス後発)	ロラゼパム	院内院外採用
ロラゼパム錠1mg「サイ」(ワイパックス後発)	ロラゼパム	院内院外採用
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	院外採用
ロレルコ錠250mg	プロブコール	院外採用
ロンサーフ配合錠T15	トリフルジン・ヒドラル塩酸塩	院外採用
ロンサーフ配合錠T20	トリフルジン・ヒドラル塩酸塩	院外採用
ワルファリン錠0.5mg	ワルファリン	院内院外採用
ワルファリン錠1mg	ワルファリンカリウム	院内院外採用
ワルファリン錠5mg	ワルファリンカリウム	院外採用
ワイドシリン細粒100mg/g(ハセツ後発)	アモキシシリン水和物	院内院外採用
ワイパックス錠0.5mg	ロラゼパム	院外採用
ワイパックス錠1mg	ロラゼパム	院外採用
ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外採用
亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	院内院外採用
杏仁(生薬キョウニン)	杏仁(生薬キョウニン)	院外採用
塩化カリウム(山善)13.4mEq/g	塩化カリウム	院内院外採用
塩化カリウム徐放錠600mg「St」(スロー後発)	塩化カリウム	院内院外採用
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	院内院外採用
塩酸バンコマイシン散0.5g/瓶	塩酸バンコマイシン	院内院外採用
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩	院外採用
塩酸モルヒネ	塩酸モルヒネ	院内院外採用
黄連(生薬オウレン)	黄連	院外採用
黄芩(生薬オウゴン)	黄芩	院外採用
黄耆(生薬オウギ)	オウギ	院外採用
牡丹皮(生薬ボタンピ)	牡丹皮	院外採用
牡蠣(生薬ボレイ)	牡蠣(生薬ボレイ)	院外採用
葛根(生薬カクコン)	葛根	院外採用
乾姜(生薬カンキョウ)	乾姜	院外採用
甘草(生薬カンゾウ)	甘草(生薬カンゾウ)	院外採用
桔梗(生薬キキョウ)	桔梗	院外採用
逆性石ケン液0.025%	塩化ベンザルコニウム	院内院外採用
強力レスタミンコーチゾンクリーム軟膏10g	ジフェントラミン(硫酸77%マイシン,酢)	院内院外採用
桂皮(生薬ケイヒ)	桂皮(生薬ケイヒ)	院外採用
五味子(生薬ゴミシ)	五味子	院外採用
厚朴(生薬コウボク)	厚朴(生薬コウボク)	院外採用
細辛(生薬サイシン)	細辛	院外採用
産婦人科用イソソクリール45%250g	ポビドンヨード	院内院外採用
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(旧マグラックス)	酸化マグネシウム	院内院外採用
酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(旧マグラックス)	酸化マグネシウム	院内院外採用
柴胡(生薬サイコ)	柴胡	院外採用
新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム, 無水リン酸二水	院内院外採用
親水ワセリン	親水ワセリン	院外採用
辛夷(生薬シンイ)	辛夷	院外採用
人工涙液マイティア点眼液5mL	ほう酸, 無機塩類	院内院外採用
人参(生薬ニンジン)	人参	院外採用
酢酸亜鉛錠25mg「ノベル」(ノベル後発)	酢酸亜鉛水和物	院内院外採用
酢酸亜鉛顆粒5%「サイ」50mg/g(ノベル後発)	酢酸亜鉛水和物	院内院外採用
生理食塩液(細口)500mL/瓶	生理食塩液	院内院外採用

生理食塩液100mL	生理食塩液	院内院外採用
生理食塩液20mL	生理食塩液	院内院外採用
生理食塩液500mL/袋	生理食塩液	院内院外採用
生姜（生薬ショウキョウ）	生姜（生薬 ショウキョウ）	院外採用
精製水	精製水	院内院外採用
精製水（滅菌）外用	精製水	院内院外採用
石膏（生薬セッコウ）	石膏	院外採用
川きゅう（生薬センキュウ）	川きゅう	院外採用
大黄（生薬ダイオウ）	大黄	院外採用
大棗（生薬タイソウ）	大棗（生薬 タイソウ）	院外採用
沢瀉（生薬タクシャ）	沢瀉	院外採用
単シロップ	白糖	院内院外採用
炭酸カルシウム（沈降）	炭酸カルシウム	院外採用
炭酸ナトリウムOD錠250mg「フー」(ホスノール後発)	炭酸ランタン水和物	院内院外採用
炭酸リチウム錠100mg「大正」(リマ後発)	炭酸リチウム	院内院外採用
炭酸リチウム錠200mg「大正」(リマ後発)	炭酸リチウム	院内院外採用
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末(旧ジューソウ)	炭酸水素ナトリウム	院内院外採用
知母（生薬チモ）	知母	院外採用
地黄（生薬ジオウ）	地黄	院外採用
注射用HCG5,000単位「F」（溶解液付）	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院内院外採用
猪苓（生薬チョレイ）	猪苓	院外採用
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」（加ダ後発）	沈降炭酸カルシウム	院内院外採用
桃仁（生薬トウニン）	桃仁	院外採用
当帰（生薬トウキ）	当帰	院外採用
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	乳酸カルシウム	院内院外採用
乳糖	乳糖	院内院外採用
白色ワセリン	白色ワセリン	院内院外採用
白朮（生薬ビャクジュツ）	白朮	院外採用
麦門冬（生薬バクモンドウ）	麦門冬	院外採用
半夏（生薬ハンゲ）	半夏（生薬 ハンゲ）	院外採用
附子（生薬ブシ）	附子（生薬 ブシ）	院外採用
麻黄（生薬マオウ）	麻黄（生薬 マオウ）	院外採用
慢性疼痛用：オキシコドンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外採用
慢性疼痛用：オキシコドンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外採用
慢性疼痛用：オキシコドンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院内院外採用
薬用炭	薬用炭	院内院外採用
竜骨（生薬リュウコツ）	竜骨（生薬 リュウコツ）	院外採用
枳実（生薬キジツ）	枳実	院外採用
芍薬（生薬シャクヤク）	芍薬（生薬 シャクヤク）	院外採用
苡仁（生薬ヨクイニン）	苡仁（生薬 ヨクイニン）	院外採用
茯苓（生薬フクリョウ）	茯苓	院外採用