レジメン名	DCyBorD療法 1-2コース目(D皮下注)				
対象がん種	全身性ALアミロイドーシス	対象患者	再発・難治	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	2
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	エンドキサン, デキサメタゾン				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	12.3%	休薬することがある
	血小板減少	9.2%	同上
	貧血	8.1%	同上
その他	infusion reaction	12.7%	中断、ステロイド投与など
	皮疹	14.3%	軟膏塗布や、中断、休薬することが
	起立性低血圧	3.6%	中断、フロリネフやミドドリン投与

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	ダラキューロ	15mL	皮下注	3-5min		●							●							●							●						
2	ベルケイド 生食	1.3mg/m^2 0.52mL/m^2	皮下注			●							●							●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カロナール	900mg/回	1日1回(ダラキューロ1時間前)			●							●							●							●						
2	ポララミンシロップ	2mg/回	1日1回(ダラキューロ1時間前)			●							●							●							●						
3	エンドキサン	300mg/m^2・回(Max500mg)	1日1回(ダラキューロ1時間前)			●							●							●							●						
4	デキサメタゾン	20mg/回	1日1回(ダラキューロ1時間前)			●	●						●	●						●	●						●	●					
5	他、適宜アシクロビル、ST合剤など																															