レジメン名	3wPCbHP療法 2回目以降				
対象がん種	乳がん	対象患者	乳癌	催吐リスク	中等度
			Stage1-3	1コースの日数	21日
			80歳未満	投与予定回数	4~9
内服抗がん剤の有無	なし		HER2陽性	投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	66.0%	
	貧血	67.0%	
	血小板減少	19.0%	
その他	心不全	0.6%	循環器内科相談、HP中止を検討
	悪心、下痢、嘔吐	1%以上	整腸剤、制吐薬等
	呼吸困難	1%以上	呼吸器内科相談、減量中止を検討

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																						休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	30分			●							●													
2	パージェタ 生食	420mg 250ml	点滴静注	30分			●																				
3	トラスツズマブ 注射用水 生食	6mg/kg 0.28ml/kg 250ml	点滴静注	60分			●																				
4	デキサート ファモチジン ボララミン パロノセトロン アロカリス 生食	6.6mg 20mg 5mg 0.75mg 235mg 50ml	点滴静注	200ml/h			●																				
5	デキサート ファモチジン ボララミン 生食	6.6mg 20mg 5mg 50ml	点滴静注	200ml/h										●													
6	生食	50ml	点滴静注	30分			●							●													
7	パクリタキセル 生食	80mg/m2 250ml	点滴静注	1時間			●							●													
8	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC:6 250ml	点滴静注	1時間			●																				
9	生食	50ml	点滴静注	30分			●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																										