

レジメン名	リンパ球除去療法（イエスカルタ）				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	5 days
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	1
				投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	71.0%
	血小板減少	29.0%
その他	サイトカイン放出症候群	92.0%
	神経学的事象	60.0%
		抗菌薬、G-CSF製剤 輸血など
		トシリズマブなど 対症療法

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	1	2	3	4	5
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●		
2	エンドキサン 生理食塩液	500mg/m ² 250mL	点滴静注	125mL/hr		●	●	●		
3	フルダラ 生理食塩液	30mg/m ² 100mL	点滴静注	200mL/hr		●	●	●		
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5
1	カイトリル	2mg	内服		●	●	●		