レジメン名	ALL-B19早期強化療法(IB+L) HR				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	42
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●		●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●	
2	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	30分		●																										
3	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50ml	点滴静注	30分		●																										
4	エンドキサン 生理食塩液	1000mg/m2 250mL	点滴静注	1時間		●																										
5	キロサイド 生理食塩液	75mg/m2 50mL	点滴静注	10分				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●	
6	ヒドロコルチゾン 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	30分	ロイナーゼ投与前			●			●				●			●				●			●				●			●	
7	ロイナーゼ 5%Glu	5000U/m2＊ 0.5mL/m2	筋注					●			●				●			●				●			●				●			●	
8	メソトレキセート キロサイド プレドニン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8ml	髄注												●														●			
9	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●		●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●	

					day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●													
2	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	30分		●													
3	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50ml	点滴静注	30分		●													
4	エンドキサン 生理食塩液	1000mg/m2 250mL	点滴静注	1時間		●													
5	キロサイド 生理食塩液	75mg/m2 50mL	点滴静注	10分															
6	ヒドロコルチゾン 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	30分	ロイナーゼ投与前														
7	ロイナーゼ 5%Glu	5000U/m2＊ 0.5mL/m2	筋注																
8	メソトレキセート キロサイド プレドニン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8ml	髄注																
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ロイケリン	60 mg/m2	就寝前　分1			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	カイトリル	2mg	化学療法前内服					●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●	

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	ロイケリン	60 mg/m2	就寝前　分1																
2	カイトリル	2mg	化学療法前内服																