

レジメン名	AML-20 強化療法-2(LR) HCI				
対象がん種	急性骨髄性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	3
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名	なし			投与予定回数	
				投与回数上限	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	-	
	-	
	-	
その他	-	
	-	
	-	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4
1	生食50mL (プロイメンドルート用)	20mL	点滴静注				•			休薬完了
2	プロイメンド 生食	3mg/kg(max150mg) 50mL	点滴静注	1時間			•			
3	ブレドニン 生食	60mg/m <sup>2</sup> (max60mg) 50mL	点滴静注	30分			•	•	•	
4	グラニセトロン 生食	0.04mg/kg 3mL	静注				•	•	•	
5	生食50mL (シタラビンルート用)	20mL	点滴静注				•	•	•	
6	シタラビン 生食	3g/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	3時間	10時		•	•	•	
7	生食50mL (シタラビンルート用)	20mL	点滴静注				•	•	•	
8	生食50mL (イダマイシシルート用)	20mL	点滴静注				•			
9	イダマイシン 注射用水 生食	10mg/m <sup>2</sup> 10mL/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	1時間			•			
10	生食50mL (イダマイシシルート用)	20mL	点滴静注				•			
11	ブレドニン 生食	60mg/m <sup>2</sup> (max60mg) 50mL	点滴静注	30分			•	•	•	
12	グラニセトロン 生食	0.04mg/kg 3mL	静注				•	•	•	
13	生食50mL (シタラビンルート用)	20mL	点滴静注				•	•	•	
14	シタラビン 生食	3g/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	3時間	22時		•	•	•	
15	生食50mL (シタラビンルート用)	20mL	点滴静注				•	•	•	
16	メソトレキセート キロサイド ヒドロコルチゾン 注射用水	12mg 30mg 25mg 4.8mL	髄注				•			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4
1	フルメトロン点眼		1日3回点眼		•	•	•	•