レジメン名	Retifanlimab+CBDCA+wPTX				
対象がん種	肛門管扁平上皮癌	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	6
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	47%(35%)	殺細胞性抗がん薬の減量、中止、延
	貧血	66%(20%)	輸血
	血小板減少症	14%(3%)%	殺細胞性抗がん薬の減量、中止、延
その他	甲状腺機能低下症	14%(1%)	甲状腺ホルモン補充。
	かゆみ	7%(1%)	抗ヒスタミン薬、ステロイド外用、
	末梢神経障害	11%(0%)	殺細胞性抗がん薬の減量、中止、延

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●							●							●												
2	生食 ジニイズ	100mL 500mg	点滴静注	240mL/h		●																										
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																										
4	デキサート アロカリス パロノセトロン ガスター ポララミン 生食	9.9mg 235mg 0.75mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																										
5	デキサート ガスター ポララミン 生食	6.6mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h									●							●												
6	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●							●							●												
7	パクリタキセル 5%　ブドウ糖注	80mg/㎡ 250mL	点滴静注	250mL/h		●							●							●												
8	カルボプラチン 5%　ブドウ糖注	AUC=5 250mL	点滴静注	500mL/h		●																										
9	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●							●							●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デカドロン錠	8mg/日	朝・昼食後				••	••																								