レジメン名	R-MA（1コース目）				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	初発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	21 days
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	4
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		抗菌薬、G-CSF
	血小板減少		輸血
	貧血		輸血
その他	肝障害		薬剤の減量、肝庇護薬
	腎障害		薬剤の減量、補液
	感染症		抗菌薬

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●	●																	
2	ポララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	30min		●																				
3	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m^2 337.5mL/m^2	点滴静注	備考参照		●																				
4	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200mL/hr			●																			
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr			●																			
6	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	110mL/hr			●																			
7	メソトレキセート 生理食塩液	500mg/m^2 50mL	点滴静注	15min	10時		●																			
8	メソトレキセート 生理食塩液	3000mg/m^2 500mL	点滴静注	3hr	10時15分		●																			
9	ソル・コーテフ 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	30min	9時30分			●	●																	
10	シタラビン 生理食塩液	2000mg/m^2 250mL	点滴静注	3hr	10時			●	●																	
11	ソル・コーテフ 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	30min	21時30分			●	●																	
12	シタラビン 生理食塩液	2000mg/m^2 250mL	点滴静注	3hr	22時			●	●																	
13	ロイコボリン 生理食塩液	48mg 20mL	静注		1時			●																		
14	ロイコボリン 生理食塩液	12mg 20mL	静注		1時				●	●																
15	ロイコボリン 生理食塩液	12mg 20mL	静注		7時			●	●	●																
16	ロイコボリン 生理食塩液	12mg 20mL	静注		13時			●	●																	
17	ロイコボリン 生理食塩液	12mg 20mL	静注		19時			●	●																	
18	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●	●																	

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									