レジメン名	頭頸部アルミノックス治療				
対象がん種	頭頸部がん	対象患者	切除不能再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	1
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	4
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	低マグネシウム血	頻度不明	マグネシウム補充
その他	Infusion reaction	2.8%	Grade1では投薬を半分に減速、Grad
	光線過敏症	4.9%	本剤投薬後は一定期間の光暴露対策

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	15分		•																										
2	生理食塩水 デキサート ボララミン	100ml 6.6mg 5mg	点滴静注	30分		•																										
3	アキャルックス	640mg/m2	点滴静注	2時間		•																										
4	生理食塩水	100ml	点滴静注	4時間		•																										

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28