

レジメン名	移植前処置FLU+CY				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者		催吐リスク	中等度
	急性骨髄性白血病			1コースの日数	8日間
	悪性リンパ腫			投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	骨髄抑制	頻度不明	
その他	出血性膀胱炎	頻度不明	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	day	1	2	3	4	5	6	7	8
1	生理食塩液 50ml フルダラ前フラッシュ	20ml	点滴静注	200ml/h		●	●	●	●	●			
2	フルダラ静注用50mg 生理食塩液 100ml	30mg/m2 100ml	点滴静注	200ml/h		●	●	●	●	●			
3	生理食塩液 50ml フルダラ後フラッシュ	20ml	点滴静注	200ml/h		●	●	●	●	●			
4	生理食塩液 50ml ホスアプレビダント前フラッシュ	20ml	点滴静注	100ml/h							●		
5	ホスアプレビダント点滴静注用 150mg 生理食塩液 100ml 3mg/kgを0.6~1.5mg/mlになるよ うに溶解し、抗がん剤投与の1時 間30分前に60分かけて投与	3.0mg/kg 100ml	点滴静注	100ml/h							●		
6	生理食塩液 50ml ホスアプレビダント後フラッシュ	20ml	点滴静注	100ml/h							●		
7	デキサート注射液0.1mg/kg 生理食塩液50ml	0.1mg/kg 50ml	点滴静注	100ml/h							●	●	
8	グラニセトロン静注液0.04mg/kg 生理食塩液20ml	0.04mg/kg 4ml	静注								●	●	
9	ウロミテキサン注400mg4mL エンドキサン投与直前	24mg/kg	静注								●	●	
10	生理食塩液 50ml エンドキサン前フラッシュ	20ml	点滴静注	125ml/h							●	●	
11	エンドキサン100mg 生理食塩液250ml	60mg/kg 250ml	点滴静注	125ml/h							●	●	
12	生理食塩液50ml エンドキサン後フラッシュ用	20ml	点滴静注	125ml/h							●	●	

