レジメン名	ALL-B19	再寛解導入	療法(IIA)	: IR, HR群	CNS1
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	デカドロン				

 _	

レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	2 3		4	5 6	6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26 2	27 28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時))																										休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		•							•							•							•					
2	オンコビン 生理食塩液	1.5mg/m2 (max 2.0mg) 50mL	点滴静注	500mL/h		•							•							•							•					
3	ドキソルビシン 生理食塩液	30mg/m2 100mL	点滴静注	1時間		•							•							•							•					
4	ロイナーゼ 5%ブドウ糖液	10000U/m2 * 1ml/m2	筋注			•			•				•			•																
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		•							•							•							•					
									1																							

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp 薬	剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 デ:	カドロン	10 mg/m2 *	分1 po		•	•	•	•	•	•	•	•	•) (•	•	•	•														
2 デ:	カドロン	5 mg/m2	分1 po																•	•	•											
3 デ:	カドロン	2.5 mg/m2	分1 po																			•	•	•								
4 デ:	カドロン	1.25 mg/m2	分1 po																						•	•	•					
4 h	1イトリル	2mg	化学療法前内服		•							•							•							•						