レジメン名	ALL-B19 再寛解導入療法(IIB)LR arm-B12SR, IR, HR				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	14
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	ロイケリン				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		-	
		-	
		-	
その他		-	
		-	
		-	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	ソリューゲンG ヘパリン1000U/mL	500mL 0.5mL (3000mL/m^2/dayとなるように投与速度を調整)	点滴静注			●													
2	生食 (プロイメンドルート用)	20mL	点滴静注			●													
3	プロイメンド 生食 (抗がん剤投与90分前に開始) (投与時メイン止め)	3mg/kg(max150mg) 50mL (0.6-1.5mg/mLになるように調整)	点滴静注	1hr		●													
4	生食 (プロイメンドフラッシュ用)	20mL	点滴静注			●													
5	アロキシ (エンドキサン投与直前)	20μg/kg (max1.5mg)	静注			●													
6	ウロミテキサン注 (エンドキサン投与直前)	400mg/m^2	静注			●													
7	生食 (エンドキサンルート用)	20mL	点滴静注			●													
8	エンドキサン 生食 (メイン止め、フィルター通す)	1000mg/m^2 100mL	点滴静注	1hr		●													
9	生食 (エンドキサンフラッシュ用)	20mL	点滴静注			●													
10	ウロミテキサン注 (エンドキサン投与4時間後)	400mg/m^2	静注			●													
11	ウロミテキサン注 (エンドキサン投与8時間後)	400mg/m^2	静注			●													
12	グラニセトロン 生食 (キロサイド投与前)	0.04mg/kg 4mL	静注												●	●	●	●	
13	キロサイド 生食 (フィルター通す)	75mg/m^2 20mL	静注					●	●	●	●				●	●	●	●	
14	生食 (キロサイドフラッシュ用)	20mL	静注					●	●	●	●				●	●	●	●	
15	グラニセトロン 生食 (髄注前)	0.04mg/kg 4mL	静注												●				
16	メソトレキセート キロサイド プレドニン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8mL	髄注					●							●				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ロイケリン	60mg/m^2	分1			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●