レジメン名	イミフィンジ・イジュド				
対象がん種	肝臓がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	1回
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1回
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他	間質性肺炎	3.2%	Grade1になるまで中止
	甲状腺機能低下	10.7%	Grade1になるまで中止
	甲状腺機能亢進	8.4%	症状が安定するまで中止

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●																											
2	イジュド 生食	300mg 100ml	点滴静注	1時間		●																											
3	生食	50ml	点滴静注	30分		●																											
4	イミフィンジ 生食	1500mg 100ml	点滴静注	1時間		●																											
5	生食	50ml	点滴静注	30分		●																											

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																