レジメン名	オプジーボ＋ヤーボイ (食道癌1次治療)(Nivo3週)				
対象がん種	食道がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	42日
				投与予定回数	未定
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	最長2年間
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	0.6%	減量・中止・延期
	血小板減少	1.9%	減量・中止・延期
	白血球数減少	0.9%	減量・中止・延期
その他	発疹	17.1%	減量・中止・延期
	甲状腺機能低下症	13.4%	減量・中止・延期
	そう痒症	13.4%	減量・中止・延期

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr		●																				●						
2	オプジーボ 生食	360mg 100ml	点滴静注	1時間		●																				●						
3	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr		●																				●						
4	ヤーボイ 生食	1mg/kg 総液量30mlになるように調製	点滴静注	30分		●																										
5	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr		●																										

					day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr															
2	オプジーボ 生食	360mg 100ml	点滴静注	1時間															
3	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr															
4	ヤーボイ 生食	1mg/kg 総液量30mlになるように調製	点滴静注	30分															
5	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr															

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																															

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	なし																		