レジメン名	ヨンデリス療法（中心静脈）				
対象がん種	骨軟部腫瘍	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	肝不全、肝機能障	20%以上	減量，休薬又は中止等の適切な処置を行う
	横紋筋融解症	1.4%	投与中止
その他	悪心	20%以上	減量，休薬等の適切な処置を行う
	倦怠感	20%以上	減量，休薬等の適切な処置を行う
	心機能障害	1.4%	減量，休薬又は中止等の適切な処置を行う

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	デキサート 生食 パロノセトロン	16.5mg 50ml 0.75mg	点滴静注	100ml/h		●																				
2	生食	100ml	点滴静注	200ml/h		●																				
3	ヨンデリス 生食	1.2mg/㎡ 500ml	点滴静注	24時間		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン錠	4mg/回					●●	●●																		