| レジメン名 | XELOX+HER 6mg/kg(2回目以降用) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 胃がん | 対象患者 | 除不能進行・再 | 催吐リスク | |
| | | | | 1コースの日数 | 21 |
| | | | | 投与予定回数 | PDまで |
| 内服抗がん剤の有無 | あり | | | 投与回数上限 | なし |
| ※有の場合薬剤名 | カペシタビン/S-1 | | | | |

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
|---|---|---|---|
| 血液毒性 | 好中球減少 | | |
| | 血小板減少 | | |
| | Hb低下 | | |
| その他 | 悪心 | | |
| | 末梢神経障害 | | |
| | 手足症候群 | | 開始時保湿剤の処方を検討 |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 1 | 生食 | 50 mL | 点滴静注 | 100 mL/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ハーセプチン<br>生食 | 6mg/kg<br>250 mL | 点滴静注 | 250 mL/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | アロキシ<br>デキサート<br>生食 | 0.75 mg<br>9.9 mg<br>100 mL | 点滴静注 | 200 mL/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | オキサリプラチン<br>5% ブドウ糖注 | 130 mg/m^2<br>250 mL | 点滴静注 | 125 mL/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 50 mL | 点滴静注 | 100 mL/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カペシタビン錠 | 1000 mg/m^2/回 | 朝・夕食後 | | | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | | | | | | |
| 2 | (エスワン) | 添付文書に従う | 朝・夕食後 | | | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | | | | | | |
| 3 | デカドロン錠 | 8mg/day | 朝・昼食後(朝食後) | | | | ●● | ●● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |