

レジメン名	キイトルーダ(3週毎)+レンビマ併用療法				
対象がん種	腎細胞がん	対象患者	切除不能・転移性	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり		投与回数上限	なし	
※有の場合薬剤名	レンビマ				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	高血圧	52.3%	別途記載
	下痢	54.5%	別途記載
	甲状腺機能低下	42.6%	別途記載
その他	食欲減退	34.9%	別途記載
	手足症候群	28.1%	別途記載
	疲労	32.1%	別途記載

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50mL	点滴静注	100ml/hr			●																				休薬完了	
2	キイトルーダ 生食	200mg 50mL	点滴静注	30min			●																					
3	生食	50mL	点滴静注	100ml/hr			●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	レンビマカプセル	1回20mg	1日1回		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食 50mL

100 ml/h

②

点滴静注

キイトルーダ 200mg  
生食 50mL

30分

③

点滴静注

生食 50mL

100 ml/h

該当分類なし

フィルター必要

バッグ、ルートともに遮光不要