レジメン名	(初回投与)Cmab(400)+PTX				
対象がん種	頭頸部がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	7日間
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)							休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	15分		●						
2	デキサート ポララミン ファモチジン 生食	6.6 mg 5 mg 20 mg 100 mL	点滴静注	30分		●						
3	生食	50 mL	静注	30分		●						
4	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m^2 250 mL	点滴静注	1時間		●						
5	生食	20 mL	点滴静注	フラッシュ		●						
6	アービタックス 生食	400 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	2時間		●						
7	生食	100 mL/h	点滴静注	100 mL/h		●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7
1	なし											