

レジメン名		CBDCA+PEM+Amivantamab 1サイクル目【80kg以上】			
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行・再発	嘔吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	10.8%
	貧血	10.8%
		0.0%
その他	発疹	16.1%
	注射部位反応	6.5%
	Infusion reaction	9.7%

レジメン内容（支持療法を含む）

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50ml	点滴静注	15分			●																					休養完了
2	アロカリス点滴静注用 パロノセトロン塩酸塩注射剤 デキサート注射液 ファモチジン20mg ボララミン5mg 生食	235mg/10ml 1瓶 0.75mg/5ml 1瓶 3.3mg/1ml 3瓶 20mg/2ml 1瓶 5mg 100ml	点滴静注	30分			●																					
3	生食	50ml	点滴静注	15分			●																					
4	ペメトレキセド点滴静注用 生食	500mg/m <sup>2</sup> 100ml	点滴静注	10分			●																					
5	カルボプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	AUC 5 250ml	点滴静注	1時間			●																					
6	生食	50ml	点滴静注	15分			●																					
7	リプロファス配合皮下注	2240mg/14mL (1600mg/1バイアル 10mL)	皮下注射	5分			●																					
7	リプロファス配合皮下注	3360mg/21mL (1600mg/1バイアル 10mL)	皮下注射 2本に分けて	5分										●								●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	アセトアミノフェン錠300mg	3錠	リプロファス投与30分前		●							●								●							
2	デカドロン錠4mg	1錠	朝食後			●	●																				
3	デザレックス錠5mg	1錠	リプロファス投与30分前									●								●							