レジメン名	Amivantamab+Lazertinib 1サイクル目【80kg未満】				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	ラズクルーズ				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	低アルブミン血症	46.6%	適正使用ガイドに準ずる
	AST上昇	22.3%	適正使用ガイドに準ずる
		0.0%	
その他	発疹	46.1%	適正使用ガイドに準ずる
	爪囲炎	53.9%	適正使用ガイドに準ずる
	Infusion reaction	13.1%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●																											
2	デキサート注射液 ガスター20mg ポララミン5mg 生食	3.3mg/1ml 3瓶 20mg/2ml 1瓶 5mg 100ml	点滴静注	30分		●																											
3	リブロファズ配合皮下注	1600mg/10mL (1600mg/1バイアル 10mL)	皮下注射	5分		●							●							●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	アセトアミノフェン錠300mg	3錠	リブロファズ投与30分前			●							●							●							●						
2	ラズクルーズ錠240mg	1錠	朝食後			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	エリキュース錠2.5mg	2錠	朝・夕食後		4か月間	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
4	デザレックス錠5mg	1錠	リブロファズ投与30分前										●							●							●						