レジメン名	キイトルーダ＋EC(術前)				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	高度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	4コース
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目			対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	23.6%	G-CSF製剤の使用、減量の検討
	貧血	25.3%	輸血の検討、減量の検討
その他	嘔気嘔吐	25.5%	
	脱毛	60.2%	
	自己免疫関連症状	33.5%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr		●																				
2	キイトルーダ 生食	200mg 50mL	点滴静注	30分		●																				
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr		●																				
4	ファモチジン デキサート パロノセトロン 生食	20mg 9.9mg 0.75mg 100mL	点滴静注	200mL/hr		●																				
5	エピルビシン 生食	90mg/m^2 100mL	点滴静注	500mL/hr		●																				
6	生食	100mL	点滴静注	500mL/hr		●																				
7	エンドキサン 生食	600mg/m^2 250mL	点滴静注	250mL/hr		●																				
8	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	イメンドカプセル	125mg/回	化学療法前			●																				
2	イメンドカプセル	80mg/回	朝食後				●	●																		
3	デカドロン錠	4mg/回	朝・昼食後				●●	●●	●●																	