レジメン名	Trastuzumab＋SOX 6mg/kg（2回目以降）				
対象がん種	胃がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	PD
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	S-1				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少症	10.3%	減量・休薬
	血小板減少		減量・休薬
その他	末梢神経障害	5.1%	減量・休薬
			トラスツズマブ投与中止・アレルギー

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100mL/h		●																				
2	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS 生食	6mg/kg 250ml	点滴静注	30分		●																				
3	デキサート パロノセトロン 生食	9.9mg 0.75mg 100ml	点滴静注	200mL/h		●																				
4	オキサリプラチン ブドウ糖5%	130mg/㎡ 250ml	点滴静注	2時間		●																				
5	生食	50ml	点滴静注	100mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	S-1	80mg/㎡/日	朝・夕食後			●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●						
2	デカドロン錠	8mg/日	朝・昼食後				●●	●●																		