レジメン名	VC療法				
対象がん種	骨軟部腫瘍	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	14日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制	頻度不明	
	感染症	16.4%	
その他	腎毒性	頻度不明	
	神経毒性	頻度不明	
	心毒性	頻度不明	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生理食塩液50ml ホスアプレピタント前フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h		●													
2	ホスアプレピタント点滴静注用 デキサート注射液 グラニセトロン静注液 生理食塩液100ml 0.6～1.5mg/mlの濃度になるように 前後生食フラッシュ メイン止め、フィルター不可	3.0mg/kg（最大150mg） 0.1mg/kg（最大4.0mg） 0.04mg/kg 100ml	点滴静注	12歳以上：30分	抗がん剤投与1時間30分前に	●													
3	生理食塩液50ml ホスアプレピタント後フラッシュ用	20ml	点滴静注	50ml/h		●													
4	生理食塩液50ml オンコビン前フラッシュ用	20ml	点滴静注	150ml/h		●													
5	オンコビン注射用1mg 生理食塩液50ml 前後で生食フラッシュ メイン止め、フィルター不可	2.0mg/m2（最大2.0mg） 30ml	点滴静注	150ml/h		●													
6	生理食塩液50ml オンコビン後フラッシュ用	20ml	点滴静注	150ml/h		●													
7	ウロミテキサン注400mg 4ml エンドキサン投与直前	480mg/m2	静注			●													
8	生理食塩液50ml エンドキサン前フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h		●													
9	注射用エンドキサン注500mg 生理食塩液250ml 投与直前、4時間後、8時間後にウロミテキサン投与	1200mg/m2 250ml	点滴静注	1時間		●													
10	生理食塩液50ml エンドキサン後フラッシュ用	20ml	点滴静注	100ml/h		●													
11	ウロミテキサン注400mg 4ml エンドキサン投与4時間後	480mg/m2	静注			●													
12	ウロミテキサン注400mg 4ml エンドキサン投与8時間後	480mg/m2	静注			●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	なし																		