| レジメン名 | DLd療法　1～2コース目（D皮下注） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 多発性骨髄腫性ALアミロイドーシス | 対象患者 | 再発・難治 | 催吐リスク | 軽度 |
| | | | 初発 | 1コースの日数 | 28 |
| | | | | 投与予定回数 | 2 |
| 内服抗がん剤の有無 | あり | | | 投与回数上限 | |
| ※有の場合薬剤名 | ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ,ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞ | | | | |

| 副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など） | | | |
|---|---|---|---|
| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性 | 好中球減少 | 12.3% | 休薬することがある |
| | 血小板減少 | 9.2% | 同上 |
| | 貧血 | 8.1% | 同上 |
| その他 | infusion reaction | 12.7% | 中断、ステロイド投与など |
| | 肺炎 | 3.8% | 休薬することがある |
| | | | |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 1 | ダラキューロ | 15mL | 皮下注 | 3-5分 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

**初発**

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カロナール | 900mg | ダラキューロ1時間前 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 2 | レナデックス | 40mg | 1日1回（ダラキューロ1時間前） | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 3 | ボララミンシロップ | 2mg | ダラキューロ1時間前 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 4 | レブラミド | 25mg | 1日1回 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 5 | 他、適宜アシクロビル、ST合剤など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**再発・難治**

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カロナール | 900mg | ダラキューロ1時間前 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 2 | レナデックス | 20mg | 1日1回（ダラキューロ1時間前） | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | |
| 3 | アタラックスPカプセル | 25mg | ダラキューロ1時間前 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 4 | レブラミド | 25mg | 1日1回 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 5 | 他、適宜アシクロビル、ST合剤など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |